
DE
RESOLUTIONE FORMVLARVM
QVADRATICARVM INDETERMINATARVM
PER NVMEROS INTEGROS.

Auctore

L. E V L E R O.

Problema I.

I.

Proposita formula irrationali $\sqrt{axx + \beta x + \gamma}$ inuenire numeros pro x substituendos, qui eam rationalem reddant.

Solutio.

Ante omnia notantum est, hanc inuestigationem frustra suscipi, nisi vnus saltem casus constet, quo ea fiat rationalis. Ponamus ergo hoc euenire casu $x = a$, eoque esse:

$$\sqrt{aaa + \beta a + \gamma} = b$$

ita vt b sit numerus rationalis. Huiusmodi autem casus, vnico cognito, innumerabiles alios ex eo deriuare licet. Ponatur in hunc finem

$$x = a + mz \text{ et } \sqrt{axx + \beta x + \gamma} = b + nz$$

A 2

ct

et hac aequatione quadrata fit :

$$\begin{aligned} &+aaa + 2amaz + ammsz = bb + 2nbz + nnz \\ &+ \beta a + \beta ms \\ &+ \gamma. \end{aligned}$$

Cum iam per hypothefin fit $bb = \alpha a + \beta a + \gamma$,
reliqua aequatio per z diuifa dabit :

$$2ama + \beta m + amms = 2nb + nnz$$

ex qua elicitur :

$$z = \frac{2ama - 2nb + \beta m}{nn - am}$$

Quo valore fubstituto concludimus :

$$\text{fi ponatur } x = \frac{(nn + am)a - 2mb + \beta m}{nn - am}$$

$$\text{fore } V(\alpha xx + \beta x + \gamma) = \frac{2amna - (nn + am)b + \beta m}{nn - am}$$

Quicumque ergo numeri pro m et n accipiantur, ex
cafii cognito: $V(\alpha aa + \beta a + \gamma) = b$, infinitis aliis
modis formula $V(\alpha xx + \beta x + \gamma)$ rationalis effici
potest, et quia numerum b tam negatiue, quam affirma-
tiue, assumere licet, exploratis numeris a et b , ac pro
ubitu affumtis numeris m et n , capiatur

$$x = \frac{(nn + am)a + 2mb + \beta m}{nn - am}$$

eritque :

$$V(\alpha xx + \beta x + \gamma) = \frac{2amna + (nn + am)b + \beta m}{nn - am}$$

Scholion.

2. Ad hoc ergo problema foluendum neceffe eft,
vt aliunde vnus faltem cafus fit cognitus, quo formula
propofita fiat rationalis. Neque vero, pro huiusmodi
cafii explorando vlla certa regula praefcribi potest, cum
etiam

etiam dentur eiusmodi formulae, quas nullo plane casu rationales fieri posse demonstratum est. Si enim verbi gratia haec formula $\sqrt{3xx+2}$ proponeretur, certum est, nullum numerum rationalem pro x inueniri posse, quo ea fieret rationalis. Quanquam autem satis noti sunt casus, quibus formula $\alpha xx + \beta x + \gamma$ talis reductionis est capax, quippe quod euenit, quoties in hac formula generali $(px+q)^2 + (rx+s)(tx+u)$ continetur: tamen hic non curo, unde casus ille, quem cognitum assumo, sit haustus, siue certa quadam ratione, siue diuinatione innotuerit. Verum cum cognito vno casu inuentio infinitorum aliorum nulla labore difficultate, hic potissimum ad solutiones, quae numeris integris absoluuntur, respicio. Cum enim valores pro x inuenti per fractionem exprimantur, noua iam oritur quaestio, quomodo numeros m et n assumi oporteat, vt inde numeri integri pro x obtineantur.

Problema II.

3. Si α, β, γ sint numeri integri dati, inuenire numeros integros pro x sumendos, qui formulam $\alpha xx + \beta x + \gamma$ quadratam reddant.

Solutio.

Iterum assumo vnum numerum integrum a constare, qui quaesito satisfaciat, ita vt sit:

$$\sqrt{\alpha aa + \beta a + \gamma} = b$$

ac modo vidimus,

$$\text{si sumatur } x = \frac{(nn + \alpha mm)a + 2mnb + \beta mm}{2n - \alpha mm}$$

A 3

fore

$$\text{fore } \sqrt{\alpha x x + \beta x + \gamma} = \frac{2\alpha m n a + (n n + \alpha m m)b + \beta m n}{n n - \alpha m m}$$

Supereft ergo tantum, vt videamus, cuiusmodi numeros pro m et n affumi oporteat, vt hae formulae integrae euadant. Quod quidem statim fieri perfpicuum est, fi vtriusque denominator $n n - \alpha m m$ statuatur vnitati aequalis. Sit igitur $n n - \alpha m m = 1$, seu

$$n n = \alpha m m + 1, \text{ ideoque } n = \sqrt{\alpha m m + 1}$$

nisi autem sit α vel numerus quadratus, vel negatiuus, huic formulae semper satisfieri potest; sin autem sit vel quadratus, vel negatiuus, ne problema quidem propositum resolverè licet. Etsi enim quandoque duo pluresue casus assignari queant, tamen infiniti non dantur, cuiusmodi tamen hic euolui conuenit. Sit ergo α numerus integer positius non quadratus, ac semper numeri m et n assignari possunt, vt fiat $n = \sqrt{\alpha m m + 1}$, quod etsi infinitis modis fieri potest, tamen sufficit minimos solos nosse. Erit ergo

$$x = (n n + \alpha m m)a + 2 m n b + \beta m m \text{ et}$$

$$\sqrt{\alpha x x + \beta x + \gamma} = 2 \alpha m n a + (n n + \alpha m m)b + \beta m m,$$

ficque habetur nouus casus quaestioni satisfaciens. Ex hoc vero simili modo, quo is ex a et b prodiit, nouus deriuabitur, hincque porro continuo alii in infinitum. Ponantur enim valores hoc modo pro x oriundi successiue: a, a^I, a^{II}, a^{III} , etc. respondentibus vero valores formulae $\sqrt{\alpha x x + \beta x + \gamma}$ sint b, b^I, b^{II}, b^{III} etc. ac sequenti modo bini quique posteriores ex binis antecedentibus definiuntur,

$$\begin{aligned}
 a^I &= (nn + am m)a + 2mnb + \beta mm; b^I = 2amna \\
 &\quad + (nn + am m)b + \beta mn \\
 a^{II} &= (nn + am m)a^I + 2mnb^I + \beta mm; b^{II} = 2amna^I \\
 &\quad + (nn + am m)b^I + \beta mn \\
 a^{III} &= (nn + am m)a^{II} + 2mnb^{II} + \beta mm; b^{III} = 2amna^{II} \\
 &\quad + (nn + am m)b^{II} + \beta mn \\
 &\text{etc.}
 \end{aligned}$$

Hac igitur ratione continuo ulterius progredi licet, sicque ex vna solutione, in numeris integris cognita, innumerabiles aliae in numeris integris quoque elicientur.

Coroll. 1.

4. Ut igitur formula $\alpha x x + \beta x + \gamma$ infinitis modis in numeris integris quadratum effici possit, necesse est, ut α neque sit numerus quadratus, neque negatiuus, ac praeterea, ut vnus casus, quo ea sit quadratum, vndecunq̄ sit cognitus.

Coroll. 2.

5. At si α fuerit numerus positiuus non quadratus, tum primum quaerantur duo numeri m et n , ut sit $n = \sqrt{\alpha m m + 1}$, id quod semper fieri potest. Quibus inuentis, si ponatur:

$$\sqrt{\alpha x x + \beta x + \gamma} = y$$

atque iam cognitus fuerit casus quaestioni satisfaciens, qui sit $x = a$ et $y = b$, ex eo per primam operationem non solum vnus, sed duo noui, inuenientur ob signi ambiguitatem. Erit quippe:

$$\begin{aligned}
 x &= (nn + am m)a + 2mnb + \beta mm \text{ et} \\
 y &= 2amna + (nn + am m)b + \beta mn.
 \end{aligned}$$

Coroll. 3.

DE RESOLUTIONE

Coroll. 3.

6. Si sumantur tantum signorum ambiguum superiora, ut continuo ad maiores numeros satisficientes perueniamus, atque valores pro x hoc modo successiue prodeunt designentur per $a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}$ etc. valores autem pro y respondentes per $b, b^I, b^{II}, b^{III}, b^{IV}$ etc. erit:

$$\begin{aligned}
 a^I &= (nn + am) a + 2mn b + \beta mm; & b^I &= 2 am n a \\
 & & & + (nn + am) b + \beta mn \\
 a^{II} &= (nn + am) a^I + 2mn b^I + \beta mm; & b^{II} &= 2 am n a^I \\
 & & & + (nn + am) b^I + \beta mn \\
 a^{III} &= (nn + am) a^{II} + 2mn b^{II} + \beta mm; & b^{III} &= 2 am n a^{II} \\
 & & & + (nn + am) b^{II} + \beta mn \\
 & & & \text{etc.}
 \end{aligned}$$

Coroll. 4.

7. Duplicem ergo hinc progressionem numerorum $a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}$ etc. et $b, b^I, b^{II}, b^{III}, b^{IV}$ etc. adipiscimur, quarum utriusque continuatio ab utraque pendet, utraque tamen ab altera ista seiungi potest, ut termini utriusque sensim sine adminiculo alterius continuari queant; formabitur autem tum in utraque serie quilibet terminus ex binis praecedentibus.

Coroll. 5.

8. Si enim in valore a^I pro b^I eius valor substituat, habebitur:

$$a^I = (nn + am) a^I + 4 am^2 n^2 a + 2 mn (nn + am) b + 2 \beta m m n n + \beta m m$$

Verum

Verum ex valore ipsius a^I est :

$$2mn b = a^I - (nn + \alpha mm) a - \beta mm$$

quo valore ipsius $2mn b$ ibi substituto prodibit:

$$\begin{aligned} a^{II} &= (nn + \alpha mm) a^I + 4 \alpha mm n n a \\ &+ (nn + \alpha mm) a^I - (nn + \alpha mm)^2 a - \beta mm (nn + \alpha mm) \\ &\quad + 2 \beta mm n n \\ &\quad + \beta mm. \end{aligned}$$

At ob $nn = \alpha mm + 1$, est $4 \alpha mm n n - (nn + \alpha mm)^2 = -(nn - \alpha mm)^2 = -1$, et $2 \beta mm n n - \beta mm (nn + \alpha mm) = \beta mm (nn - \alpha mm) = \beta mm$, vnde fit :

$$a^{II} = 2 (nn + \alpha mm) a^I - a + 2 \beta mm.$$

Coroll. 6.

9. Cum igitur simili modo fit :

$$a^{III} = 2 (nn + \alpha mm) a^{II} - a^I + 2 \beta mm \text{ etc.}$$

Statim atque in serie a, a^I, a^{II}, a^{III} etc. duo primi termini habentur, primus scilicet a vndecunque, et secundus ex formula $a^I = (nn + \alpha mm) a + 2mn b + \beta mm$, ex his sequentes omnes per has formulas definientur :

$$\begin{aligned} a^{II} &= 2 (nn + \alpha mm) a^I - a + 2 \beta mm \\ a^{III} &= 2 (nn + \alpha mm) a^{II} - a^I + 2 \beta mm \\ a^{IV} &= 2 (nn + \alpha mm) a^{III} - a^{II} + 2 \beta mm. \end{aligned}$$

Coroll. 7.

10. Pari autem modo progressio numerorum b, b^I, b^{II}, b^{III} etc. est comparata. Primo enim eius termino aliunde cognito, et secundo per formulam

$b^I = 2\alpha mn a + (nn + \alpha mm)b + \beta mn$, si in b^{II} pro a^I valor substituatur, erit:

$$b^{II} = 2\alpha mn(nn + \alpha mm)a + 4\alpha mn nb + 2\alpha\beta m^2 n + (nn + \alpha mm)b^I + \beta mn$$

at ex valore ipsius b^I est $2\alpha mn a = b^I - (nn + \alpha mm)b - \beta mn$ quo substituto fit ob $nn - \alpha mm = 1$

$$b^{II} = 2(nn + \alpha mm)b^I - b \text{ similiterque}$$

$$b^{III} = 2(nn + \alpha mm)b^{II} - b^I$$

$$b^{IV} = 2(nn + \alpha mm)b^{III} - b^{II}$$

etc.

Coroll. 8.

11. Cum igitur vtraque series ita sit comparata, ut quilibet terminus ex binis praecedentibus secundum certam legem definiatur; vtraque series erit recurrens, scala relationis existente $2(nn + \alpha mm)$, -1 . Hinc ergo, formata aequatione $zz = 2(nn + \alpha mm)z - 1$, eius radices erunt:

$$z = 2nn - 1 \pm 2n\sqrt{nn - 1} = (n \pm m\sqrt{\alpha})^2.$$

Coroll. 9.

12. Hinc ergo ex doctrina serierum recurrentium progressionis $a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}$ etc. terminus quicumque indefinite per sequentem formulam exprimatur: alterius vero seriei b, b^I, b^{II}, b^{III} etc. terminus quicumque per hanc:

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{\beta}{4\alpha} + \frac{b}{2\sqrt{\alpha}}\right)(n + m\sqrt{\alpha})^{2y} + \left(\frac{a}{2} + \frac{\beta}{4\alpha} - \frac{b}{2\sqrt{\alpha}}\right)(n - m\sqrt{\alpha})^{2y} - \frac{\beta}{2\alpha} = x$$

sumto pro y numero quocunque integro.

Scholion.

Scholion.

13. Si hic pro 2γ substituamus successive omnes numeros integros 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. vtraque progressio prodibit interpolata, cuius termini medii quaesito aeque satisficient, dummodo fuerint integri. At reperiemus: posito

$$2\gamma = 0; x = a;$$

$$2\gamma = 1; x = na + mb + \frac{\beta(n-1)}{2\alpha};$$

$$2\gamma = 2; x = (nn + amn)a + 2mb + \beta mn;$$

$$y = b$$

$$y = nb + ama + \frac{\beta m}{2}$$

$$y = (nn + amn)b + 2ama + \beta mn.$$

Quae vtraque series est recurrens, scalam relationis habens $2n, -1$; ac pro priori quidem valorum ipsius x , si terni termini consecutiui sint P, Q, R , erit

$$R = 2nQ - P + \frac{\beta(n-1)}{\alpha};$$

at si in progressione valorum ipsius y terni termini se ordine sequentes sint P, Q et R , erit

$$R = 2nQ - P;$$

Quodsi ergo fuerit $\frac{\beta(n-1)}{2\alpha}$ numerus integer, omnes hi termini problema aeque resolvent, sicque duplo plures obtinebimus solutiones, quam methodus adhibita suppeditauerat. Quod autem plures locum habere possint solutiones, quam inuenimus, inde facile colligitur, quod praeter necessitatem primum erutarum formularum $nn - amn$ unitati aequalem posuimus, cum tamen sine dubio saepe etiam numerator per denominatorem diui-

di possit, etiamsi hic vnitatem sit maior. Quemadmodum igitur omnes plane solutiones in numeris integris inueniri queant, sequenti problemate accuratius examinemus.

Problema 3.

14. Si a sit numerus integer positivus non quadratus, dato vno numero integro a , qui pro x positus reddat formulam $\alpha x x + \beta x + \gamma$ quadratam, inuenire infinitos alios numeros integros, qui pro x sumti idem sint praestituri.

Solutio.

Ponatur in genere $\sqrt{\alpha x x + \beta x + \gamma} = y$, casu autem cognito, quo $x = a$, esse $\sqrt{\alpha a a + \beta a + \gamma} = b$, atque hinc in genere fractionibus non exclusis fore vidimus:

$$x = \frac{(n n + \alpha m m) a + 2 m n b + \beta m m}{n n - \alpha m m}$$

$$y = \frac{(n n + \alpha m m) b + 2 \alpha m n a + \beta m n}{n n - \alpha m m}$$

Iam quidem, vt hi numeri fiant integri, non absolute necesse est, vt denominator $n n - \alpha m m$ ad vnitatem reuocetur, verum sufficit, vt fractiones $\frac{n n + \alpha m m}{n n - \alpha m m}$ et $\frac{2 m n}{n n - \alpha m m}$ in numeros integros abeant. Ponamus ergo esse

$$\frac{n n + \alpha m m}{n n - \alpha m m} = p, \text{ et } \frac{2 m n}{n n - \alpha m m} = q$$

vnde fit $p - 1 = \frac{2 \alpha m m}{n n - \alpha m m}$; ideoque

$$\frac{\beta m m}{n n - \alpha m m} = \frac{\beta}{2 \alpha} (p - 1) \text{ et } \frac{\beta m n}{n n - \alpha m m} = \frac{1}{2} \beta q.$$

Deinde

Deinde autem ex formulis assumtis fiet

$$pp - aqq = \frac{(nm + am)^2 - am^2n^2}{(nm - am)^2} = 1$$

ita ut sit $pp = aqq + 1$ et $p = \sqrt{aqq + 1}$.

Iterum igitur ut ante ex numero a binos numeros p et q assignari oportet, ut sit $p = \sqrt{aqq + 1}$, quibus inuentis habebitur:

$$x = pa + qb + \frac{\beta}{2\alpha}(p-1) \text{ et } y = pb + aqa + \frac{1}{2}\beta q.$$

Dummodo ergo fuerit $\frac{\beta}{2\alpha}(p-1)$ numerus integer, hi valores satisfaciunt. Quia autem numeros p et q tam negative, quam positive, sumere licet, hae formulae insuper tres alias solutiones suppeditant:

$$x = pa - qb + \frac{\beta}{2\alpha}(p-1); \text{ et } y = pb - aqa - \frac{1}{2}\beta q$$

$$x = -pa + qb - \frac{\beta}{2\alpha}(p+1); \text{ et } y = -pb + aqa + \frac{1}{2}\beta q$$

$$x = -pa - qb - \frac{\beta}{2\alpha}(p+1); \text{ et } y = -pb - aqa - \frac{1}{2}\beta q$$

Quod si porro horum bini quicumque pro a et b assumantur, ex quolibet quatuor nouae solutiones orientur. Hinc tamen non 61, sed tantum sex diuersae oriuntur, inter quas adeo prima cognita $x = a$ et $y = b$, et quae huic est affinis $x = -a - \frac{\beta}{\alpha}$, et $y = b$ continentur; reliquae vero quatuor sunt

$$x = (pp + aqq)a \pm 2pqb + \beta qq;$$

$$y = (pp + aqq)b \pm 2apqa + \beta pq$$

$$x = -(pp + aqq)a \pm 2pqb - \frac{\beta}{\alpha}pp;$$

$$y = (pp + aqq)b \mp 2apqa \mp \beta pq$$

ex quibus deinceps nouae aliae in infinitum inueniri possunt.

Coroll. 1.

15. Quodsi ergo fuerit vel $\beta = 0$, vel eiusmodi numerus, ut $\beta(p-1)$, vel etiam $\beta(p+1)$ per 2α diuisibile existat, tum hoc modo plures solutiones in integris obtinentur, quam modo ante exposito.

Coroll. 2.

16. In genere autem obseruandum est, si satisfecerit casus quicumque $x = v$, tum etiam satisfacturum esse casum $x = -v - \frac{\beta}{\alpha}$, ex utroque enim y eundem ualorem nanciscitur. Quare cum hi casus ex illis tam facile eliciantur, his omissis inuestigatio solutionum convenientium ad dimidium reducitur.

Coroll. 3.

17. Reiectis ergo casibus $x = -v - \frac{\beta}{\alpha}$, quippe qui sponte se produunt inuentis casibus $x = v$, ex casu $x = a$ et $y = b$ statim bini reperiuntur:

$$x = pa + qb + \frac{\beta}{2\alpha}(p-1); \quad y = aqa + pb + \frac{\beta}{2}q$$

hincque porro per operationem secundam bini:

$$x = (pp + aqq)a + 2pqb + \beta qq; \quad y = 2apqa + (pp + aqq)b + \beta pb$$

quae duplicitas ex signo ambiguo numeri b nascitur.

Coroll. 4.

18. Si haec cum §. §. 12 et 13 conferantur, patebit omnes has formulas in sequentibus expressionibus generalibus contineri, siquidem pro μ successive omnes numeri integri substituantur.

$$I \begin{cases} x = \frac{1}{4\alpha}(2\alpha a + \beta + 2b\sqrt{\alpha})(p + q\sqrt{\alpha})^\mu + \frac{1}{4\alpha}(2\alpha a + \beta - 2b\sqrt{\alpha})(p - q\sqrt{\alpha})^\mu - \frac{\beta}{2\alpha} \\ y = \frac{1}{4\sqrt{\alpha}}(2\alpha a + \beta + 2b\sqrt{\alpha})(p + q\sqrt{\alpha})^\mu - \frac{1}{4\sqrt{\alpha}}(2\alpha a + \beta - 2b\sqrt{\alpha})(p - q\sqrt{\alpha})^\mu \end{cases}$$

et.

$$II \begin{cases} x = \frac{1}{4\alpha}(2\alpha a + \beta - 2b\sqrt{\alpha})(p + q\sqrt{\alpha})^\mu + \frac{1}{4\alpha}(2\alpha a + \beta + 2b\sqrt{\alpha})(p - q\sqrt{\alpha})^\mu - \frac{\beta}{2\alpha} \\ y = \frac{1}{4\sqrt{\alpha}}(2\alpha a + \beta - 2b\sqrt{\alpha})(p + q\sqrt{\alpha})^\mu - \frac{1}{4\sqrt{\alpha}}(2\alpha a + \beta + 2b\sqrt{\alpha})(p - q\sqrt{\alpha})^\mu \end{cases}$$

Coroll. 5.

19. Hinc igitur duplices series pro valoribus numerorum x et y reperiuntur, quae eandem progressionis legem tenebunt. Si enim ponamus:

$$x = a; a^I; a^{II}; a^{III}; a^{IV}; a^V; \text{ etc. } P, Q, R$$

$$y = b; b^I; b^{II}; b^{III}; b^{IV}; b^V; \text{ etc. } S, T, V$$

erit pro altera: $a^I = pa + qb + \frac{\beta}{2\alpha}(p-1)$ et $b^I = \alpha qa + pb + \frac{1}{2}\beta q$

et pro altera: $a^I = pa - qb + \frac{\beta}{2\alpha}(p-1)$ et $b^I = \alpha qa - pb + \frac{1}{2}\beta q$

pro utraque vero haec communis progressionis lex. valebit, ut fit:

$$R = 2pQ - P + \frac{\beta}{\alpha}(p-1) \text{ et } V = 2pT - S$$

Coroll. 6.

20. Cum fit $pp - \alpha q q = 1$, erit $(p + q\sqrt{\alpha})^\mu = (p - q\sqrt{\alpha})^{-\mu}$ et $(p - q\sqrt{\alpha})^\mu = (p + q\sqrt{\alpha})^{-\mu}$; hincque, si alterae series retrorsum continuantur, prodibunt alterae. Sufficit ergo pro altero casu has series instruxisse, quae tam antorsum, quam retrorsum, continuatae omnes solutiones, ex ambiguitate numeri b oriundas, in se continebunt.

Scholion.

Scholion.

21. Si ergo fuerit $\beta = 0$, vt habeatur haec formula: $\sqrt{\alpha x x + \gamma} = y$, rationalis reddenda, casusque constet, quo fit $\sqrt{\alpha a a + \gamma} = b$, sumtis numeris p et q ita, vt fit $p = \sqrt{\alpha q q + 1}$, innumerabiles alii valores satisfaciētes continebuntur in his seriebus:

$$x = a, a^I, a^{II}, a^{III}, a^{IV}, \dots P, Q, R$$

$$y = b, b^I, b^{II}, b^{III}, b^{IV}, \dots S, T, V$$

vbi secundi termini ita debent accipi, vt fit

$$a^I = p a + q b; b^I = \alpha q a + p b$$

deinde vtraque series est recurrens, scala relationis existente $2p, -1$. Erit scilicet:

$$a^{II} = 2p a^I - a; \text{ et in genere } R = 2p Q - P$$

$$b^{II} = 2p b^I - b; \dots V = 2p T - S$$

ambae vero series etiam retrorsum continuari debent, sicque duplo plures prodibunt solutiones, nisi fit vel $a = 0$, vel $b = 0$. Neque autem hic in censum veniunt solutiones negatiuae, quibus si satisfecerit $x = v$, etiam satisfacit $x = -v$. Omnes porro istae solutiones continentur in his formulis generalibus,

$$x = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} (a\sqrt{\alpha} + b)(p + q\sqrt{\alpha})^\mu + \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} (a\sqrt{\alpha} - b)(p - q\sqrt{\alpha})^\mu$$

$$y = \frac{1}{2} (a\sqrt{\alpha} + b)(p + q\sqrt{\alpha})^\mu - \frac{1}{2} (a\sqrt{\alpha} - b)(p - q\sqrt{\alpha})^\mu$$

Pro variis igitur numeris, qui coefficientem α constituunt, sequentia exempla euoluamus, et quidem generalius, vt etiam coefficientis β ratio habeatur, pro casibus scilicet, quibus forte $\frac{\beta}{2\alpha}(p-1)$ fuerit numerus integer.

Exem-

Exemplum I.

22. Proposita formula $\sqrt{(2xx + \beta x + \gamma)} = y$,
 inuenire infinitos valores integros ipsius x , quibus haec
 formula rationalis euadit, siquidem vna solutio constet.

Sit solutio cognita $x = a$ et $y = b$, et ob $a = 2$,
 habebimus $p = \sqrt{(2qq + 1)}$, ideoque $q = 2$ et $p = 3$.
 Hinc secundi valores erunt:

$$a^1 = 3a + 2b + \frac{\beta}{2}; b^1 = 4a + 3b + \beta.$$

Cum igitur in §. 19. sit $R = 6Q - P + \beta$ et $V = 6T - S$,
 habebimus sequentes series valorum satisfaciendum et
 quidem integrorum, si β fuerit numerus par:

Valores ipsius x	Valores ipsius y
a	$+ b$
$3a + 2b + \frac{\beta}{2}$	$4a + 3b + \beta$
$17a + 12b + 4\beta$	$24a + 17b + 6\beta$
$99a + 70b + \frac{49}{2}\beta;$	$140a + 99b + 35\beta$
$577a + 408b + 144\beta;$	$816a + 577b + 204\beta$
$3363a + 2378b + \frac{1681}{2}\beta;$	$4756a + 3363b + 1189\beta$
etc.	etc.

Tum vero cum y eosdem retineat valores, si pro x
 scribatur $-x - \frac{\beta}{2}$, etiam haec solutiones locum habebunt:

Valores ipsius x	Valores ipsius y
$-a - \frac{1}{2}\beta$	$+ b$
$-3a + 2b - \beta$	$4a + 3b + \beta$
$-17a + 12b - 4\beta$	$34a + 17b + 6\beta$
$-99a + 70b - 25\beta$	$140a + 99b + 35\beta$
$-577a + 408b - 225\beta$	$816a + 577b + 204\beta$
$-3363a + 2378b - 841\beta$	$4756a + 3363b + 1189\beta$
etc.	etc.

Tom. IX. Nou. Comm.

C

Etiam si

Etiamsi ergo β non fuerit numerus par, tamen in utroque ordine semiffis valorum ipsius x fuerit numeri integri.

Exemplum 2.

23. *Proposita formula $\sqrt{(3xx + \beta x + \gamma)} = y$, inuenire infinitos valores integros ipsius x , quibus haec formula rationalis euadit, siquidem vnus casus constet.*

Praebeat casus cognitus $x = a$ et $y = b$, tum vero ob $\alpha = 3$ capiatur $p = \sqrt{(3qq + 1)}$, eritque $q = 1$ et $p = 2$. Hinc pro secundo casu habebimus:

$$a^I = 2a + b + \frac{\beta}{6}; \quad b^I = 3a + 2b + \frac{1}{2}\beta,$$

ex quibus formentur binae series recurrentes, secundum has scalas relationis:

$$R = 4Q - P + \frac{\beta}{2}; \quad V = 4T - S,$$

vnde obtinentur:

Valores ipsius x		Valores ipsius y
a		$+ b$
$2a + b + \frac{1}{6}\beta$		$3a + 2b + \frac{1}{2}\beta$
$7a + b + \beta$		$12a + 7b + 2\beta$
$26a + 15b + \frac{25}{6}\beta$		$45a + 26b + \frac{15}{2}\beta$
$97a + 56b + 16\beta$		$168a + 97b + 28\beta$
$362a + 209b + \frac{361}{6}\beta$		$627a + 362b + \frac{209}{2}\beta$
$1351a + 780b + 225\beta$		$2340a + 1351b + 390\beta$
etc.		etc.

Practe-

Præterea vero scribendo $-x - \frac{\beta}{5}$ pro x prodibunt

valores ipsius x	valores ipsius y
$-a - \frac{1}{5}\beta$	$+ b$
$-2a + b - \frac{1}{5}\beta$	$3a + 2b + \frac{1}{5}\beta$
$-7a + 4b - \frac{4}{5}\beta$	$12a + 7b + 2\beta$
$-26a + 15b + \frac{3}{5}\beta$	$45a + 26b + \frac{15}{5}\beta$
$-97a + 56b - \frac{49}{5}\beta$	$168a + 97b + 28\beta$
$-362a + 209b - \frac{121}{5}\beta$	$627a + 362b + \frac{209}{5}\beta$
$-1351a + 780b - \frac{676}{5}\beta$	$2340a + 1351b + 390\beta$
etc.	etc.

Prout ergo numerus β diuisibilis fuerit per 2, vel 3, vel vtrumque, hinc eo plures solutiones in integris eliciuntur.

Exemplum 3.

24. Proposita formula $\sqrt{5xx + \beta x + \gamma} = y$, inuenire infinitos valores integros ipsius x , quibus haec formula rationalis euadat, siquidem vnus casus fuerit cognitus.

Pro casu cognito sit $x = a$ et $y = b$, et ob $a = 5$, quaerantur numeri p et q , vt sit $p = \sqrt{5qq + 1}$. Fiet ergo $q = 4$ et $p = 9$; et hinc secunda solutio prodibit:

$$a^I = 9a + 4b + \frac{4}{5}\beta; \quad b^I = 20a + 9b + 2\beta.$$

Cum ergo sit $a^{II} = 18a^I - a + \frac{8}{5}\beta$ et $b^{II} = 18b^I - b$, sequentes solutiones habebuntur:

Valores ipsius x	Valores ipsius y
a	$+ b$
$9a + 4b + \frac{4}{5}\beta$	$20a + 9b + 2\beta$
$161a + 72b + 16\beta$	$360a + 161b + 36\beta$
$2889a + 1292b + \frac{1444}{5}\beta$	$6460a + 2839b + 646\beta$
etc.	etc.

C 2

vbi

vbi pro quolibet valore ipsius x etiam poni potest $-x - \frac{\beta}{\gamma}$.

Scholion I.

25. Cum hoc modo ex vna solutione in integris cognita, infinitae aliae solutiones etiam in integris eliciantur, quaestio nascitur, an hoc modo omnes plane solutiones integrae obtineantur, nec ne? Ac in exemplis quidem primo et secundo nullum erit dubium, quin hac methodo omnes solutiones integrae obtineantur. Verum in exemplo tertio vtique dantur casus, quibus multo plures solutiones in integris exhiberi possunt, quam quidem hac methodo reperiuntur. Veluti si proposita fuerit formula $\sqrt[3]{(5xx+4)}=y$, quae pro casu cognito praebet $a=0$ et $b=2$, nostra solutio dat:

Valores ipsius x	Valores ipsius y
0	2
8	18
144	322
2584	5778
etc.	etc.

Verum hanc formulam diligentius scrutanti patebit, non solum his casibus $\sqrt[3]{(5xx+4)}$ fieri rationalem, sed etiam istis numeris pro x substituendis

$x=0, 1, 3, 8, 21, 55, 144, 377, 987, \text{etc.}$

vnde solutionum numerus triplicatur. Cuius rei ratio est, quod ad formulam $p = \sqrt[3]{(5qq+1)}$ resoluendam posuimus $q=4$; vnde fit $p=9$; quae quidem est simplicissima solutio in numeris integris. At quoniam in

scala

scala relationis inest $2p$, ea numeris integris constabit, etiam si p sit fractio denominatorem habens 2. Hanc ob rem istas simpliciores solutiones nanciscemur, si ponamus $q = \frac{1}{2}$, unde fit $p = \frac{3}{2}$; sicque, ob $\alpha = 5$, secundi valores erunt:

$$a^I = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{10}\beta; \quad b^I = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{4}\beta$$

ac tertii cum sequentibus per hanc legem suppeditabuntur:

$$a^{II} = 3a^I - a + \frac{1}{10}\beta, \quad b^{II} = 3b^I - b,$$

unde nanciscimur hos valores:

Valores ipsius x		Valores ipsius y
a		$\frac{1}{2}b$
$\frac{5}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{10}\beta$		$\frac{5}{2}a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{4}\beta$
$\frac{7}{2}a + \frac{3}{2}b + \frac{1}{4}\beta$		$\frac{15}{2}a + \frac{7}{2}b + \frac{3}{4}\beta$
$9a + 4b + \frac{1}{2}\beta$		$20a + 9b + 2\beta$
$\frac{47}{2}a + \frac{21}{2}b + \frac{9}{4}\beta$		$105a + \frac{47}{2}b + \frac{21}{4}\beta$
$\frac{125}{2}a + \frac{55}{2}b + \frac{121}{10}\beta$		$275a + \frac{125}{2}b + \frac{55}{4}\beta$
$161a + 72b + 16\beta$		$360a + 161b + 36\beta$
etc.		etc.

Atque hinc illae triplo plures solutiones oriuntur, quoties fuerit $a + b$ numerus par, ac β vel $= 0$, vel per 20 diuisibile.

Scholion 2.

26. Quandoque ergo plures solutiones in numeris integris reperiuntur, si pro p et q fractiones cum denominatore 2 assumuntur, quod quando in genere eueniat, operae pretium erit inuestigasse. Plerumque autem hi casus locum non habent, nisi sit vel $\beta = 0$,

vel formula ad talem formam reduci possit. Sit ergo proposita formula $\sqrt{\alpha x x + \gamma} = y$, cui satisficiat casus $x = a$ et $y = b$; tum statuatur $p = \frac{m}{2}$ et $\frac{n}{2}$, seu quaerantur numeri m et n , ut sit $mm = \alpha nn + 4$ et $m = \sqrt{\alpha nn + 4}$. Tum vero solutio prima statim dat secundam;

$$a^I = \frac{ma + nb}{2} \quad \text{et} \quad b^I = \frac{\alpha na + mb}{2},$$

vbi quidem numeri m et n tam negative, quam affirmative, accipi possunt. Denique his binis primis inventis, sequentes per hanc regulam reperientur:

$$a^{II} = ma^I - a \quad \text{et} \quad b^{II} = mb^I - b.$$

In genere autem quilibet numerus pro x satisfaciens continetur hac formula:

$$x = \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} (a\sqrt{\alpha + b}) \left(\frac{m+n\sqrt{\alpha}}{2}\right)^{\mu} + \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} (a\sqrt{\alpha - b}) \left(\frac{m-n\sqrt{\alpha}}{2}\right)^{\mu},$$

ex qua fit:

$$y = \frac{1}{2} (a\sqrt{\alpha + b}) \left(\frac{m+n\sqrt{\alpha}}{2}\right)^{\mu} - \frac{1}{2} (a\sqrt{\alpha - b}) \left(\frac{m-n\sqrt{\alpha}}{2}\right)^{\mu}.$$

Quoties igitur $ma + nb$ prodierit numerus par, neque tamen m et n sint pares, toties triplo plures solutiones in integris prodeunt, quam methodo praecedente. Hae vero solutiones ita se habebunt:

$a = a$	$b = b$
$a^I = \frac{ma + nb}{2}$	$b^I = \frac{mb + \alpha na}{2}$
$a^{II} = \frac{(m^2 - 2) a + mnb}{2}$	$b^{II} = \frac{(m^2 - 2) b + \alpha mna}{2}$
$a^{III} = \frac{(m^4 - 3m^2 + 2) a + (m^3 - 2m) nb}{2}$	$b^{III} = \frac{(m^4 - 3m^2 + 2) b + \alpha (m^3 - 2m) na}{2}$
$a^{IV} = \frac{(m^6 - 4m^4 + 2) a + (m^5 - 2m^3) nb}{2}$	$b^{IV} = \frac{(m^6 - 4m^4 + 2) b + \alpha (m^5 - 2m^3) na}{2}$
$a^V = \frac{(m^8 - 5m^6 + 5m^4 - 2) a + (m^7 - 2m^5 + 2) nb}{2}$	$b^V = \frac{(m^8 - 5m^6 + 5m^4 - 2) b + \alpha (m^7 - 2m^5 + 2) na}{2}$

etc.

Obser-

Observatio I.

27. Haec altera methodus tum demum plures solutiones in numeris integris suppeditat, quam prior, cum m et n fuerint numeri impares, simulque a et b ambo vel pares, vel impares. Si enim m et n sint numeri pares, p et q erunt integri, et formula $m = \sqrt{ann + 4}$, easdem solutiones praebabit, ac formula $p = \sqrt{aqq + 1}$. Deinde si $ma + nb$ non fuerit numerus par, valores a^I, a^{II} non euadent integri, neque propterea plures solutiones reperiuntur, quam priore methodo, dum adhibetur formula $p = \sqrt{aqq + 1}$. Distingui ergo oportet eos casus, quibus formulae $m = \sqrt{ann + 4}$, numeris imparibus pro m et n accipiendis, satisfieri potest, id quod statim patet fieri non posse, si a fuerit numerus formae $4z - 1$, vel etiam huius $8z + 1$. Quare pro a alii numeri impares non relinquuntur, nisi qui sint formae $4z + 5$. Pro his ergo casibus minimos valores, formulae $m = \sqrt{ann + 4}$ satisfaciētes, sequens tabella exhibet:

Si fuerit	capiatur	eritque	Si fuerit	capiatur	eritque
$a = 5$	$n = 1$	$m = 3$	$a = 61$	$n = 195$	$m = 1523$
$a = 13$	$n = 3$	$m = 11$	$a = 69$	$n = 75$	$m = 623$
$a = 21$	$n = 1$	$m = 5$	$a = 77$	$n = 1$	$m = 9$
$a = 29$	$n = 5$	$m = 27$	$a = 85$	$n = 9$	$m = 83$
$a = 37$	$n = -$	$m = -$	$a = 93$	$n = 57$	$m = 839$
$a = 45$	$n = 1$	$m = 7$	quaeritur hic ratio, cur casus		
$a = 53$	$n = 7$	$m = 51$	$a = 37$ non recipiat valores impares pro m et n ?		

Hic

Hic igitur patet, si sit $\alpha = 37$, non dari numeros imparès pro m et n , pro reliquis autem casibus resolutio succedit. Ita si proponatur haec formula $\sqrt{(53xx+28)} = y$, habetur statim $a = 1$ et $b = 9$. Deinde ob $n = 7$ et $m = 51$, erit $a^1 = \frac{51}{2} + \frac{63}{2} = 57$ et $b^1 = \frac{271}{2} + \frac{459}{2} = 415$, seu etiam $a^1 = -6$; et $b^1 = -44$; et series recurrentes pro x et y , quarum scala relationis est $51, -1$, erunt:

$$x = \text{etc.} - 307; - 6; 1; 57; 2906; \text{etc.}$$

$$y = \text{etc.} + 2235; + 44; 9; 415; 21156; \text{etc.}$$

Obferuatio 2.

28. Sufficit autem casus euoluiffe, quibus in formula generali $\alpha xx + \beta x + \gamma$ secundus terminus deest, quoniam haec ad talem formam salua numerorum integritate reuocari potest. Vulgaris quidem modus, quo ex aequationibus secundus terminus tolli solet, ponendo $x = y - \frac{\beta}{2\alpha}$, hic locum habere nequit, nisi β sit numerus per 2α diuisibilis. Verum si $\alpha xx + \beta x + \gamma$ debeat esse quadratum, ponatur $\alpha xx + \beta x + \gamma = yy$, ac multiplicando per 4α prodibit $4\alpha xx + 4\alpha\beta x + 4\alpha\gamma = 4\alpha yy$,

$$\text{ideoque } 4\alpha yy + \beta\beta - 4\alpha\gamma = (2\alpha x + \beta)^2$$

Quaerantur ergo casus, quibus formula $4\alpha yy + \beta\beta - 4\alpha\gamma$ fit quadratum, indeque habebuntur valores pro x substituendi, qui formulam $\alpha xx + \beta x + \gamma$ reddant quadratam, scilicet si fuerit $\sqrt{(4\alpha yy + \beta\beta - 4\alpha\gamma)} = z$, erit $2\alpha x + \beta = z$, hincque $x = \frac{z - \beta}{2\alpha}$.

Quodsi

Quodsi δ fuerit numerus par, puta 2δ , posito:
 $\alpha x x + 2\delta x + \gamma = y y$, erit $(ax + \delta)^2 = \alpha y y + \delta\delta - \alpha\gamma$
 sicque formula $\alpha y y + \delta\delta - \alpha\gamma$ ad quadratum est re-
 vocanda; ac si inuenimus $V(\alpha y y + \delta\delta - \alpha\gamma) = z$, erit
 $\alpha x + \delta = z$, et $x = \frac{z - \delta}{\alpha}$, vnde plerumque pro x
 numeri integri reperiuntur; etsi enim forte $\frac{z - \delta}{\alpha}$ non
 fuerit integer, tamen ex vno valore z cognito, si
 modo supra tradito alii eliciantur in infinitum, alterni
 saltem erunt numeri integri. Ex quo perspicuum
 est, resolutionem formularum quadraticarum radicalium
 $V(\alpha x x + \beta x + \gamma)$ nulla limitatione affici, etiamsi ter-
 minus βx plane omittatur, sicque totum negotium huc
 redit, vt formulae huiusmodi $V(\alpha x x + \gamma)$ rationales,
 et quidem in numeris integris reddantur.

Observatio 3.

29. Iam annotaui, formulam $\alpha x x + \gamma$ in nu-
 meris integris saltem pluribus ac infinitis modis qua-
 dratum effici non posse, nisi α sit numerus positius
 non quadratus. Existente autem α tali numero, pro-
 blema non ita resolui potest, vt pro quocunq; numero
 pro γ assumto, solutio succedat: possent enim vtique
 eiusmodi numeri pro γ dari, vt problema nullam
 plane solutionem admitteret, atque hanc ob rem postu-
 lari vniam saltem solutionem cognitam esse debere, quo
 ipso casus insolubiles exclusi. Verum dato α caracte-
 res exhiberi possunt, ex quibus dignosci liceat, vtrum
 numerus γ sit eiusmodi, qui solutionem admittat, nec
 ne? Ac primo quidem perspicuum est, nullam solu-

tionem locum habere posse, nisi γ fit numerus in tali formula $bb - aaa$ contentus. Dato ergo numero a , formetur series omnium numerorum, tam positiuorum, quam negatiuorum, qui quidem in formula $bb - aaa$ sint contenti; ac nisi γ in hac serie reperiatur, certo pronunciare licet, formulam $\sqrt{axx + \gamma}$ nullo modo rationalem reddi posse: vicissim autem, quoties γ in hac serie comprehenditur, quia tum est $\gamma = bb - aaa$, formula $axx + \gamma$ fit quadratum, ponendo $x = a$, eritque $\sqrt{axx + \gamma} = b$. Haec igitur series, cuius quasi terminus generalis est $bb - aaa$, primo continebit, sumto $a = 0$, omnes numeros quadratos 1, 4, 9, 16, 25, etc. tum vero omnes quadratos per $-a$ multiplicatos nempe: $-a$, $-4a$, $-9a$, $-16a$, etc. Praeterea si p et q fuerint numeri in hac serie contenti, in ea quoque reperiatur eorum productum pq ; nam cum sit $p = bb - aaa$ et $q = dd - aac$, erit $pq = (bd + aac) - a(bc + ad)^2$, et ob ambiguitatem signi hoc productum duplici modo est numerus formae $bb - aaa$, ideoque statim habentur duae solutiones $x = bc + ad$ et $x = bc - ad$.

Obseruatio 4.

30. Hinc ergo consecuti sumus hoc Theorema eximium, quod fundamentum superiorum solutionum in se complectitur:

„ Si fuerit $axx + p = yy$ casu $x = a$ et $y = b$ tum
 „ vero etiam $axx + q = yy$ casu $x = c$ et $y = d$; haec
 „ formula $axx + pq = yy$ adimplebitur capiendo
 $x = bc + ad$ et $y = bd + aac$

Si

Si enim sit $q=1$ et $dd=acc+1$, praeterea vero formulae $axx+p=yy$ satisfiat casu $x=a$ et $y=b$; qui est casus supra pro cognito assumtus; tum eidem formulae satisficient valores:

$$x=bc+ad \text{ et } y=bd+aac$$

vnde eadem omnino solutio conficitur, quam supra exhibuimus, atque ex longe diuersis principiis elicuimus: quocirca haec postrema inuestigationis ratio ob concinnitatem et perspicuitatem eo magis est notatu digna. Hic vero accedit, quod haec ratio multo latius pateat, quam praecedens, quippe quae ad casum $q=1$ fuerat adstricta. Demonstratio autem istius Theorematis elegantissimi ita breuissime se habebit:

„ Cum sit $aaa+p=bb$, erit $p=bb-aaa$

„ et ob $acc+q=dd$, erit $q=dd-acc$

„ hinc erit $pq=(bb-aaa)(dd-acc)$, quae expressio reducitur ad hanc:

$$pq=(bd+aac)^2-a(bc+ad)^2$$

„ Quodsi ergo fuerit $x=bc+ad$ et $y=bd+aac$,

„ erit $pq=yy-axx$, ideoque $axx+pq=yy$.

Q. E. D.

Obseruatio. §.

31. Cum igitur pro quolibet numero α formulae $axx+\gamma=yy$ numerus γ debeat esse formae $bb-aaa$, numeri in hac forma contenti diligentius examinari merentur; et quoniam, si inter eos occurrunt numeri p et q , simul quoque eorum productum pq

D 2

occur-

occurrit, praeter numeros quadratos $1, 4, 9, 16, 25$ etc. eorumque multipla negativa $-a, -4a, -9a, -16a, -25a$ etc. imprimis numeri primi in hac forma contenti sunt spectandi, quippe ex quibus deinceps per multiplicationem compositi nascuntur.

I. Sit $a=2$ et numeri primi formae $bb-2aa$ sunt:
positivi: $+1, +2, +7, +17, +23, +31, +41, +47,$
 $+71, +73, +79, +89, +97$ etc.
negativi: $-1, -2, -7, -17, -23, -31, -41, -47,$
 $-71, -73, -79, -89, -97$ etc.
qui praeter $+2$ et -2 omnes in forma $\pm(8n+1)$ continentur.

II. Sit $a=3$ et numeri primi formae $bb-3aa$ sunt:
positivi: $+1, +13, +37, +61, +73, +97,$
 $+109$, etc.
negativi: $-2, -3, -11, -23, -47, -59, -71,$
 $-83, -107$, etc.
qui praeter -2 et -3 omnes continentur in forma $\pm 2n+1$, siquidem pro n tam numeri positivi, quam negativi, capiuntur.

III. Sit $a=5$ et numeri primi formae $bb-5aa$ sunt:
positivi: $+1, +5, +11, +19, +29, +31, +41,$
 $+59, +61, +71, +79, +89, +101$, etc.
negativi: $-1, -5, -11, -19, -29, -31, -41,$
 $-59, -61, -71, -79, -89, -101$, etc.
qui praeter $+5$ et -5 , omnes in forma $10n+1$ continentur.

IV.

IV. Sit $\alpha=6$ et numeri primi formae $bb-6aa$ sunt:
positivi: $+1, +3, +19, +43, +67, +73,$
 $+97, \text{etc.}$

negativi: $-2, -23, -29, -47, -53, -71,$
 $-101, \text{etc.}$

qui, praeter -2 et $+3$, omnes in alterutra harum formarum: $24n+1$ et $24n-5$ continentur, sumendo pro n numeros tam negativos, quam positivos.

V. Sit $\alpha=7$ et numeri primi formae $bb-7aa$ sunt:
positivi: $+1, +2, +29, +37, +53, +109$ etc.

negativi: $-7, -3, -19, -31, -47, -59, -83$ etc.
qui praeter $+2$ et -7 omnes in vna harum formarum continentur: $28n+1$; $28n+9$; $28n+25$

Observatio 6.

32. Hinc colligimus, omnes numeros primos in formula $bb-aaa$ contentos simul in quibusdam huiusmodi formulis $-4an+A$ contineri, dum pro A certi quidam numeri substituuntur. Quod idem etiam hoc modo ostendi potest: ponatur $b=2ap+r$ et $a=2q+s$ ac formula $bb-aaa$ transit in hanc:

$$4aapp+4apr+rr-4aqq-4aqs-sss$$

statuatur $app+pr-qq-qs=n$ et habebimus

$$bb-aaa=4an+rr-sss$$

omnes ergo numeri primi formae $bb-aaa$ quoque in hac forma $4an+rr-sss$ continentur; atque ut hi numeri sint primi, r et s ita accipi oportet, ut nu-

merus $rr - ass$ sit vel ipse primus, vel saltem ad $4a$
 primus. Primo ergo sumto $s=0$, pro r successive
 accipi possunt numeri impares ad a primi, ac si rr
 fuerit maius quam $4a$, inde $4a$ toties subtrahatur, quo-
 ties fieri potest, ut residuum sit minus quam $4a$, et
 quot hoc modo diuersi numeri resultant, ii in formula
 $4an + A$ loco A collocentur. Deinde etiam simili
 modo colligantur numeri ex formulis $rr - a$, qui qua-
 tenus sunt diuersi, ad illos insuper adiciantur. Non au-
 tem opus est, pro s alios numeros praeter unitatem
 assumere; si enim s esset numerus par, numerus $-ass$
 iam in forma $4an$ contineretur, et si s esset impar,
 numerus $-ass$ haberet formam $-4aN - a$, cuius pars
 $-4aN$ iam in $4an$ continetur, sicque sufficit pro
 formulis $4an + A$, quouis casu has $4an + rr$ et
 $4an + rr - a$ euoluere, eaeque iam omnes numeros
 primos, qui quidem in formula $bb - aaa$ comprehen-
 duntur, in se complectentur. Num autem vicissim
 omnes numeri primi, in his formulis $4an + rr$ et
 $4an + rr - a$ contenti, simul sint numeri formae
 $bb - aaa$? quaestio est altioris indaginis, quae tamen
 affirmanda videtur.

Observatio 7.

33. Quo haec exemplo illustremus, sit $a=13$,
 et ex $4an + rr$ et $4an + rr - a$ orientur hae for-
 mulae pro numeris primis:

ex $4an + rr$ $52n + 1$ $52n + 9$ $52n + 25$ $52n + 49 = 52n - 3$ $52n + 81 = 52n - 23$ $52n + 121 = 52n + 17$	ex $4a + rr - a$ $52n - 9$ $52n + 3$ $52n + 23$ $52n + 51 = 52n - 1$ $52n + 87 = 52n - 17$ $52n + 131 = 52n - 25$
--	---

quae formulae reducuntur ad has:

$$52n + 1; 52n + 3; 52n + 9; 52n + 17; 52n + 23; 52n + 25;$$

ac numeri primi in his contenti sunt:

$$+ 1; + 3; + 17; + 23; + 29; + 43; + 53; + 61; + 79; + 101; + 103;$$

quibus addi debet $+ 13$; tum vero omnes numeri quadrati; atque si insuper adiciantur producta ex binis pluribusque horum numerorum, obtinebuntur hoc quidem casu omnes numeri, qui pro γ substituti producant formulam $13xx + \gamma = yy$ in numeris integris resolvablem; seu quicumque illorum numerorum pro γ accipiatur, unus primo deinde infiniti numeri integri pro x inueniri possunt, quibus formula $13xx + \gamma$ quadratum reddatur. Omnes enim isti numeri simul in forma $bb - 13aa$ continentur; qui enim huc difficilio-

$$res reductu videntur, sunt: $-1 = 18^2 - 13 \cdot 5^2$
 $+ 13 = 65^2 - 13 \cdot 18^2$; $-3 = 7^2 - 13 \cdot 2^2$; $17 = 15^2 - 13 \cdot 4^2$;
 $-17 = 10^2 - 13 \cdot 3^2$;
 $-23 = 43^2 - 13 \cdot 12^2$; $+ 29 = 9^2 - 13 \cdot 2^2$; $-29 = 32^2 - 13 \cdot 9^2$;
 $+ 43 = 76^2 - 13 \cdot 21^2$
 $-43$$$

$$\begin{aligned}
 -43 &= 3^2 - 13 \cdot 2^2; +53 = 51^2 - 13 \cdot 14^2; -53 = 8^2 - 13 \cdot 3^2; \\
 &\quad +61 = 23^2 - 13 \cdot 6^2 \\
 -61 &= 24^2 - 13 \cdot 7^2; +79 = 14^2 - 13 \cdot 3^2; -79 = 16^2 - 13 \cdot 5^2; \\
 &\quad \text{etc.}
 \end{aligned}$$

Cum ergo sit $-1 = 18^2 - 13 \cdot 5^2$, si fuerit $+\gamma = bb - 13aa$, erit $-\gamma = (18b \pm 65a)^2 - 13(18a \pm 5b)^2$, unde casus difficiliores resolvuntur.

Proposita ergo resolvenda hac aequatione $13xx + 43 \cdot 79 = yy$, cum sit $\gamma = 43 \cdot 79 = -43 \cdot -79$, habebitur per compositionem:

$$\text{I. } \gamma = (14 \cdot 76 \pm 13 \cdot 63)^2 - 13(14 \cdot 21 \pm 3 \cdot 76)^2 \\
 \text{ergo } x = 294 \pm 228 \text{ et } y = 1064 \pm 819$$

$$\text{II. } \gamma = (3 \cdot 16 \pm 13 \cdot 10)^2 - 13(2 \cdot 16 \pm 3 \cdot 5)^2 \\
 \text{ergo } x = 32 \pm 15 \text{ et } y = 130 \pm 48$$

unde statim 4 solutiones obtinentur.

Observatio 8.

34. Verum non semper ex his numeris primis, quos modo inuestigare docuimus, cum quadratis omnes plane numeri, qui pro γ assumi possunt, reperiuntur, cuius rei exemplum est casus $a = 10$, pro quo valores ipsius γ in hac forma $bb - 10aa$ continentur; iique sunt, tam negative, quam positive, sumti:

1, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 24, 25, 26, 31, 36, 39, 40, 41, 49, 54, 60, 64, 65, 71, 74, 79, 81, 86, 89, 90, 96, 100, 104, 106, 111, 121, 124, 129, 134, 135, 144, 150, 151, 156, 159, 160, 164, 166, 169, 185, 186, 191, 196, 199, 201, etc.

inter

inter quos numeros occurrunt primo omnes quadrati:
 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, etc.
 deinde numeri primi 31, 41, 71, 79, 89, 151, 191, 199, etc.
 qui in his formulis continentur $40n \pm 1$ et $40n \pm 9$.
 insuperque accedunt producta ex binis pluribusue horum
 numerorum. Tertio vero praeter hos adfunt numeri
 ex binis numeris primis compositi, qui sunt:

2. 3; 2. 5; 2. 13; 2. 37; 2. 43; 2. 53; 2. 67; 2. 83; etc.
 3. 5; 3. 13; 3. 37; 3. 43; 3. 53; 3. 67; etc.
 5. 13, 5. 37, etc.

At hi numeri primi, quorum semper bini sunt in se
 multiplicandi, sunt primo 2 et 5, reliqui vero in his
 formulis continentur $40n \pm 3$ et $40n \pm 13$. Deni-
 que etiam secundum regulam generalem adiaci debent
 producta ex binis pluribusue numeris, qui per se satisfaciunt.
 Ita resolui poterit haec aequatio: $10xx + 13.53.151 = yy$
 nam est $13.53 = bb - 10aa$ existente $b = 27$ et $a = 2$
 et $151 = dd - 10cc$; existente $d = 31$ et $c = 9$. hinc-
 que

$$13.53.151 = (bd + 10ac)^2 - 10(ad + bc)^2$$

et $x = ad + bc$ et $y = bd + 10ac$.

Deinde cum etiam sit $-13.53 = BB - 10AA$ et
 $-151 = DD - 10CC$, hinc duae aliae solutiones re-
 periantur. Cum autem sit $-1 = 3^2 - 10.1^2$, si fuerit
 $\gamma = bb - 10aa$, erit $-\gamma = (3a + b)^2 - 10(3a + b)^2$.
 Solutiones autem hinc oriundae sunt:

$$x = 181; x = 305; x = 307;$$

$$y = 657; y = 1017; y = 1023;$$

duae enim inter se conueniunt, ita vt hinc tres tantum
 reperiantur.

Observatio 9.

35. Hoc ergo casu $a=10$ pro γ triplicis generis numeros primitiuos inuenimus, primo scilicet numeros quadratos omnes, deinde certos numeros primos in formulis $40n+1$ et $40n+9$ contentos, tertio autem producta ex binis certis numeris primis, qui sunt 2, 5 et reliqui ex his formulis $40n+3$ et $40n+13$ petendi, atque ex hoc demum triplici ordine omnes numeri pro γ idonei formantur, vt huic aequationi $10xx+\gamma=yy$ satisfieri possit. Ipsi autem numeri primi in formulis $40n+3$ et $40n+13$ contenti non conueniunt, quia non sunt formae $bb-10aa$, sed tamen hi numeri omnes sunt formae $2bb-5aa$; vti etiam duo iis iungendi 2 et 5. Manifestum autem est, si habeantur duo numeri huiusmodi $2bb-5aa$ et $2dd-5cc$, eorum productum fore $=(2bd+5ac)^2-10(bc+ad)^2$, ideoque pro γ adhiberi posse. Huiusmodi igitur producta binorum numerorum primorum, qui ipsi non satisfaciunt, occurrere nequeunt, si a fuerit numerus primus, sed tantum, vti hic vtu venit, si a fuerit numerus compositus; quod tamen etiam non semper locum habet, vti vidimus casu $a=6=2.3$, quo numeri formae $3bb-2aa$ conueniunt cum numeris formae $bb-6aa$. Quodsi ergo in genere fuerit $a=pq$, et aequatio $pqxx+\gamma=yy$ resolui debeat, numerus γ vel esse debet numerus quadratus, vel primus formae $bb-pqaa$, vel productum ex duobus numeris primis formae $pbb-qa$, propterea quod huiusmodi productum est:

$$(pbb-qa)(pdd-qcc)=(pbd+qac)^2-pq(bc+ad)^2$$

Nisi

Nisi ergo tales numeri primi iam ipsi $pbb-qa a$ in forma $bb-pqaa$ contineantur, tertius ille ordo numerorum ex binis numeris primis conflatorum accedit. Quemadmodum deinde numeri primi solitarii continentur in formulis

$$4pqn+rr \text{ et } 4pqn+rr-pq$$

ita numeri primi alteri combinandi ex formula hac:

$$4pqn+pr r-qs s$$

deriuari debent.

Exemplum 1.

36. Inuestigentur omnes valores idonei ipsius γ , vt haec aequatio $30xx+\gamma=yy$ resolutionem admittat.

Primo quidem pro γ assumi possunt omnes numeri quadrati, deinde omnes numeri primi in his formis $120n+rr$ et $120n+n-30$ contenti, quae reducuntur ad has:

$120n+1$; $120n+49$; $120n+19$; $120n-29$, cum -5 vade oriuntur hi numeri primi infra 200

positiui: $+19$, $+139$

et negatiui: -5 , -29 , -71 , -101 , -149 , -191

Tertio ob $a=2, 3, 5$, sumi possunt producta trinorum primorum, qui contineantur vel ambo in vna harum formularum:

I. $120n+2rr-15ss$, II. $120n+3rr-10ss$;

III. $120n+5rr-6ss$

harum autem binae priores eosdem numeros primos dant, qui sunt $+2, +3$, et reliqui in his formulis

E 2

conti-

continentur :

$120n-7$; $120n-13$; $120n+17$; $120n-37$
 unde nascuntur hi numeri primi infra 200
 positivi . $+2$; $+3$; $+17$; $+83$; $+107$; $+113$; $+137$
 negativi : -7 ; -13 ; -37 ; -103 ; -127
 quorum binorum producta pro γ capienda sunt ;
 $+6$, $+34$, $+51$, $+91$, $+166$

-14 , -21 , -26 , -39 , -74 , -111 , -119
 Tertia autem formula continet numerum primum $+5$,
 cum his formis :

$120n-1$; $120n-19$; $120n+29$; $120n-49$
 unde nascuntur hi numeri primi infra 200
 positivi: 5 , $+29$, $+71$, $+101$, $+149$, $+191$
 negativi: -1 , -19 , -139

At ex horum combinatione iidem nascuntur numeri,
 qui iam ex numeris primis primitiuis oriuntur. Quo-
 circa omnes numeri, qui pro γ substitui possunt, erunt
 infra 200 :

$+1$, $+4$, $+9$, $+16$, $+25$, $+36$, $+49$, $+64$, $+81$,
 $+100$, $+121$, $+144$, $+169$, $+196$,
 -5 , $+19$, -29 , -71 , -101 , $+139$, -149 , -191
 $+6$, -14 , -21 , -26 , -34 , -39 , $+51$, -74 , $+91$,
 -111 , -119 , $+166$
 -20 , $+24$, -30 , -45 , $+54$, -56 , $+70$, $+76$, -80 , -84 ,
 -95 , $+96$, -104 , $+105$
 $+114$, -116 , -125 , -126 , $+130$, $+136$, $+145$, $+150$,
 -156 , -170 , $+171$, -189 , $+195$
 reliqui

reliqui autem numeri omnes pro γ assumti reddent problema impossibile.

Exemplum 2.

37. Resoluere in numeris integris aequationem

$$5xx + 11.19.29 = yy$$

Quia est $a=5$ et $\gamma = 11.19.29$, factores hi cum forma $bb-5aa$ conueniunt, et singuli in ea contineri deprehenduntur: nam

pro 11 est $b=4, a=1$ vnde etiam producta ex
 19 -- $b=8, a=3$ binis in eadem forma
 29 -- $b=7, a=2$ continentur

pro 11.19 est $\left\{ \begin{array}{l} b=17; a=4 \\ b=47; a=20 \end{array} \right\}$ ergo tertium adiun-
 gendo

pro 11.19.29 est $\left\{ \begin{array}{l} b=79; a=6 \\ b=159; a=62 \\ b=129; a=46 \\ b=529; a=234 \end{array} \right\}$

Cum iam fit $1=9^2-5.4^2$, seu $b=9$ et $a=4$ pro 1, hae formulae insuper per 1 multiplicatae duplicabuntur, fietque pro 11.19.29

$$\begin{array}{l|l} b=591; a=262 & b=241; a=102 \\ b=831; a=370 & b=2081; a=930 \\ b=191; a=78 & b=81; a=10 \\ b=2671; a=1194 & b=9441; a=4222 \end{array}$$

Hinc ergo iam duodecim solutiones problematis sumus nacti, quae sunt:

I. $x=6; y=79$	VII. $x=234; y=529$
II. $x=10; y=81$	VIII. $x=262; y=591$
III. $x=46; y=129$	IX. $x=370; y=831$
IV. $x=62; y=159$	X. $x=930; y=2081$
V. $x=78; y=191$	XI. $x=1194; y=2671$
VI. $x=102; y=241$	XII. $x=4222; y=9441$

ex quibus porro cum formula $1=9^2-5.4^2$ coniungendis infinite nouae eaeque omnes elicientur: ex secunda scilicet prodit

$x=414; y=929$; et ex sexta $x=1882; y=4209$
 ex quinta $x=1466; y=3279$; ex octaua $x=4722;$
 $y=10559$; sicque iam sedecim solutiones fumus adepti.

Conclusio.

38. His expositis non amplius coacti fumus, proposita huiusmodi aequatione $\alpha xx + \gamma = yy$, primum quasi diuinando vnum casum satisfaciendum anquirere, sed numerum γ examinando secundum formulas modo traditas statim pronunciare possumus, vtrum aequatio resolutionem admittat, nec ne? ac si admittit, per eadem principia vnam saltem solutionem elicere licebit, quod quidem promte fieri poterit, si numerus γ fuerit resolubilis in factores non nimis magnos. Verum si numerus γ sit primus ac praegrandis, iudicium quidem solubilitatis aequae est facile, at inuentio vnius solutionis maiorem laborem requirit. Veluti si proponatur $30xx + 1459 = yy$, quia 1459 est numerus primus formae $120n + 19$, aequatio est resolubilis; verum ei satisfieri sumendo $x=39$ et $y=217$

NON

non tam facile inuestigatur. Inuestigatio tamen subleuatur, si statuamus $y = 30z + 7$, vnde fit $xx = 30zz + 14z - 47$, et iam citius reperiemus $z = 7$, et $x = 39$ vnde prodit $y = 217$. At si ponamus $y = 30z + 13$, fit $xx = 30zz + 26z - 43$, promptiusque inuenitur $x = 5$ et $y = 47$. Verum in numeris multo maioribus labor euadit insuperabilis, methodusque certa adhuc desideratur negotium conficiendi: deinde etiam quod omnes numeri primi, in supra allatis formulis $4an + A$ contenti, simul sint numeri huius formae $bb - aaa$, ad eas propositiones pertinet, quas veras credimus, etiam si demonstrare non valeamus. In quo cum eximia pars Theoriae numerorum versetur, qui huius generis problemata diligentius perscrutari voluerit, nullum est dubium, quin non contemnendas veritates sit eruturus; ob eandemque causam confido haec ipsa, quae hic attuli, vsu non esse caritura: ea ipsa enim quae adhuc sunt incognita accuratius exposuisse non parum iuuabit.
