



DE
CURVIS TRIANGVLARIBVS.

Auctore
L. E V L E R.

§. I.

Curvas triangulares voco, quae tribus arcibus AB, AC et BC intus inflexis constant, qui in angulis A, B et C coeant, praeterea autem nullos alios ramos contineant. Huiusmodi ergo curvae vt sint continuae, siue quapiam aequatione, vel algebraica, vel etiam transcendente, exprimi queant, necesse est, vt in angulis A, B et C habeant cuspides acutissimas, vbi bini arcus coeuntes communi tangente sint praediti. Tales autem curvas innumerabiles exhiberi posse, tam algebraicas, quam transcendentes, iam olim ostendi, cum Problema de eiusmodi curuis, circa datum punctum lucidum describendis, proposuisssem, ita vt omnes radii, a curua bis reflexi, iterum in ipsum punctum lucidum reuertantur, quod Problema variis solutionibus in Actis Lipsiensibus pro Annis 1746 et 1748 solutum reperitur. Hic enim tota
A 2 solutio

Tab. I.
Fig. 1.

solutio ad inuentionem huiusmodi curuarum triangularium
reducitur, quippe quibus causticae radorum reflexorum
formantur.

Tab. I. §. 2. Praeter eum usum autem, quem istiusmo-
[Fig. 2. di curuae triangulares in commemorato problemate catop-
trico praestant, imprimis considerari merentur curuae, quae
ex evolutione talis curuae triangularis $A B C$ nascun-
tur. Hunc in finem vocemus longitudinem arcus $A B = c$,
arcus $A C = b$ et arcus $B C = a$. Iam arcui $A B$ conci-
piatur filum applicatum, quod extra A prolongetur vsque
in F , ita ut sit $A F = f$, et stilus in F insertus promo-
ueatur, donec arcus $A B$ fuerit euolutus, et filum perue-
niat in situm $B g$, eritque $B g = A F + \text{arcu } A B = f + c$;
tum motus stili continuetur et filum $B g$ successiue appli-
cetur arcui $B C = a$, donec perueniat in H , eritque

$B C + C H = B g = f + c$, vnde fit $C H = f + c - a$;
quo cum fuerit peruentum, filum applicetur arcui $C A$; vbi
notari conuenit, perinde esse, siue arcus $C A$ maior sit, siue
minor arcu $C B$; semper enim filum totum arcum $C A$
occupare debet. Iam motus stili ex H continuetur in f ,
donec filum $f A$ cuspidem A tangat, tum igitur erit

$$A f = C H + A C = f + c - a + b;$$

Nunc igitur filum motum $A f$ successiue arcum $A B$ in-
uoluet, donec perueniat in G , eritque

$$B G = A f - A B = f - a + b.$$

Iam filum ab arcu $B A$ transferatur in arcum $B C$ et e-
uoluatur, donec perueniat in situm $C b$, vbi erit

$$C b = B G + B C = f + b.$$

Denique stilus ab b promoueat inuoluendo arcum $C A$,
hoc-

hocque modo reuertetur in ipsum punctum F, vbi motus est inceptus: erit enim $AF = Ch - CA$, ideoque $AF = f$; erat autem utique $AF = f$.

§. 3. Hinc igitur patet, curuam, ex evolutione curvae triangularis ABC natam, esse curuam in se redeuntem, et tractu vniformi praeditam, scilicet FgHfGbF, si modo puncta F, H, G extra curuam ABC cadant. Atque hic ista insignis proprietas ante omnia se offert: quod rectae FAf, HCb et GBg non solum vtrinque ad curuam sint normales, vti ex natura evolutionis manifestum est, sed etiam, quod inter se sint aequales; est enim

$$FAf = AF + Af = 2f + c - a + b,$$

tum vero

$$ACb = CH + Cb = 2f + c - a + b,$$

simili modo

$$GBg = BG + Bg = 2f + c - a + b.$$

Verum haec proprietas multo latius patet. Si enim per quoduis punctum S nostrae curuae triangularis producatum vtrinque tangens X S x, ea etiam ex natura evolutionis vtrinque ad curuam descriptam erit normalis; tum vero erit

$$SX = CS + CH = f + c - a = CS,$$

deinde vero etiam erit

$$Sx = FA + AS = f + AS.$$

hinc tota recta

$$Xx = 2f + c - a + CS + AS = 2f + c - a + b, \text{ ob } AS + CS = AC = b,$$

quocirca curua, ex evolutione curuae triangularis ABC nata, hac eximia gaudet proprietate: vt si ad eius punctum quodcumque X ducatur normalis, donec curuae iterum occurrat

currat in x , ea etiam in hoc puncto ad curuam sit normalis, ac praeterea tota hac recta Xx vbique eandem habeat longitudinem $= 2f + c - a + b$, quae proprietas vulgo circulo tam propria esse videtur, vt vix in alias lineas curuas competere posse videatur.

§. 4. Mirum hic sine dubio videbitur, quod ternalatera figurae triangularis a , b et c non aequaliter in formulas inuentas ingrediantur. Ratio autem huius disparitatis in eo est sita, quod interuallum AF potius quam CH vel BG simplici litera f designauimus. Quo igitur hanc inaequalitatem euitemus, et vniiformitatem in calculum introducamus, vocemus interuallum $AF = k + a$, ita vt sit $f = k + a$, atque omnes rectae supra exhibitae iam sequenti modo concinne exprimentur:

$$AF = k + a; \quad BG = k + b; \quad CH = k + c$$

$$Af = k + b + c; \quad Bg = k + a + c; \quad Cb = k + a + b$$

tum vero nunc longitudo omnium rectarum, per curuam descriptam normaliter ductarum, erit $= 2k + a + b + c$. Hic autem quantitatem k pro lubitu accipere licet, ita vt ex eadem figura triangulari innumerae curuae istius indolis describi possint. Quin etiam quantitas k adeo negatiue accipi poterit, dummodo formulae $k + a$; $k + b$ et $k + c$ positiuos obtineant valores; si enim haec interualla fierent negatiua, curua descripta non amplius prodiret circuli-formis, sed intra curuam ABC caderet, atque etiam tres cuspides g , f , b esset habitura, quemadmodum ex natura euolutionis facile colligere licet.

Tab. I.
Fig. 3.

§. 5. Huiusmodi autem curuas, ex euolutione curvarum triangularium natas, quatenus cum circulo tam egregie

gregie conueniunt, breuitatis gratia *Orbiformes*. nomine-
 mus, hicque ante omnia obseruasse iuuabit, ex qualibet
 curua orbiformi problema catoptricum supra memoratum
 infinitis modis facillime resolui posse. Sit enim $F G H$
 talis curua orbiformis quaecunq̄ue, intra qua punctum
 lucidum X pro lubitu constituatur; tum ducta recta qua-
 cunq̄ue $X x$, ad curuam vtrinque normali, quae ergo
 constantem habeat magnitudinem, iungantur rectae $L X$
 et $L x$, eaque bifecentur in punctis O et o , vnde ad
 eas normaliter educantur rectae $O Z$ et $o z$, rectae $X x$
 occurrentes in punctis Z et z ; haecque duo puncta sita
 erunt in curua quaesita. Radius enim $L Z$, primo reflexus,
 fiet $Z z$, qui, denuo reflexus in z , in ipsum pun-
 ctum lucidum L remittetur, quemadmodum ex natura re-
 flexionis haud difficulter demonstrare liceret, nisi hoc ar-
 gumentum iam vberime esset pertractatum.

Tab. I
 Fig. 4

§. 6. Ob hunc insignem vsum curuarum triangul-
 arum vtiq̄ue optandum esset, vt methodus certa pateret,
 cuius ope huiusmodi curuas triangulares, quotquot libuerit,
 inuestigare liceret, id quod primo intuitu nimis difficile
 videri potest. Verum hanc inuestigationem inertamus, ac
 primo quaeramus curuas orbiformes, quales hactenus de-
 scripsimus; tum enim certi esse poterimus, earum euolutas
 huiusmodi fore curuas triangulares quales desideramus,
 Praeterea vero etiam hoc modo istud commodum asse-
 quemur: vt, quoties curua orbiformis fuerit algebraica,
 toties quoque curua triangularis non solum fiat alge-
 braica, sed insuper etiam rectificabilis, quandoquidem
 euolutae omnium curuarum algebraicarum simul rectifica-
 tionem admittunt.

§. 7.

Tab. I.
Fig. 5.

§. 7. Sit igitur $FMfm$ talis curva orbiformis, qualem inuestigare nobis est propositum, in qua sumamus rectam Ff pro axe fixo, qui vtrisque ad curuam sit normalis, cuius longitudinem ponamus $Ff = 2f$. Tum ex puncto quocunque M ad curuam ducatur normalis Mm , quae ergo etiam in m ad curuam debet esse normalis, eiusque longitudo Mm itidem sit $= 2f$. Iam ex punctis M et m ad axem Ff demittantur perpendiculara PM et pm , ac pro puncto M vocentur coordinatae $FP = X$ et $PM = Y$, at pro puncto m sit $Fp = x$ et $pm = -y$, quia haec applicata in partem contrariam cadit. His positis talis aequatio inter X et Y desideratur, ut, si loco X scribatür x , valor ipsius Y sponte prodeat $= -y$. Nisi enim hoc fieret, tota curva $FMfm$ non esset continua. Sequenti autem modo hae quatuor quantitates a se inuicem pendunt: Cum interuallum PN sit subnormalis respectu puncti M , posito $dY = P dX$, erit haec subnormalis $PN = PY$, hincque normalis $MN = Y\sqrt{1+PP}$. Simili modo pro altero puncto m erit pN subnormalis retro posita; vnde sumto $dy = p dx$ erit $pN = -py$; hinc normalis $mN = -y\sqrt{1+pp}$. Quia igitur triangula PMN et pmN sunt similia, erit $P = p$. Porro quia nouimus esse $Mm = 2f$, ex m agatur axi parallela mS , ipsi MP productae occurrens in S , et similitudo triangulorum MNP et MmS dabit $MS = \frac{2f}{\sqrt{1+pp}}$ et $mS = \frac{2fp}{\sqrt{1+pp}}$.

Cum igitur sit
 $MS = MP + mp = Y - y$ et $mS = Fp - FP = x - X$
 hinc colligitur
 $Y - y = \frac{2f}{\sqrt{1+pp}}$ et $x - X = \frac{2fp}{\sqrt{1+pp}}$

prae-

praeterea vero, vti iam notauimus, debet esse

$$\frac{dY}{dX} = P = p \text{ et } \frac{dy}{dx} = p.$$

§. 8. Cum igitur inuenerimus differentias coordinatarum $Y - y$ et $x - X$, statuamus earum summas $X + x = 2Q$ et $Y + y = 2R$, hincque singulas coordinatas adipiscemur ita expressas:

$$X = Q - \frac{fp}{\sqrt{(1+pp)}}; Y = R + \frac{f}{\sqrt{(1+pp)}};$$

$$x = Q + \frac{fp}{\sqrt{(1+pp)}}; y = R - \frac{f}{\sqrt{(1+pp)}}.$$

Hinc igitur differentiando erit

$$dX = dQ - \frac{fdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}};$$

$$dY = dR - \frac{fpdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}};$$

$$dx = dQ + \frac{fdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}};$$

$$dy = dR + \frac{fpdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}}.$$

Cum igitur esse debeat $dY = p dX$ et $dy = p dx$, fiet

$$dR - \frac{fpdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}} = p dQ - \frac{fpdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}} \text{ et}$$

$$dR + \frac{fpdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}} = p dQ + \frac{fpdp}{(1+pp)^{\frac{3}{2}}}.$$

Ex vtraque harum aequationum sequitur fore $dR = p dQ$, ideoque $R = fp dQ$.

§. 9. Cum igitur omnibus conditionibus satisfacimus, quantitas Q arbitrio nostro permittitur, eiusque ergo loco functio quaecunque ipsius p accipi poterit, quae autem ita debet esse comparata, ut formula $p dQ$ integrationem admittat, siquidem curvas algebraicas desideremus. Quoniam igitur pro coordinatis x et y inuenimus:

$$x = Q + \frac{fp}{\sqrt{(1+pp)}} \text{ et } y = R - \frac{f}{\sqrt{(1+pp)}}$$

existente $R = \int p dQ$; pro alteris vero coordinatis X et Y fit

$$X = Q - \frac{fp}{\sqrt{(1+pp)}} \text{ et } Y = R + \frac{f}{\sqrt{(1+pp)}}$$

manifestum est, has ex illis nasci, si modo formulae radicalis $\sqrt{(1+pp)}$ signum immutetur. Quare cum haec formula per suam naturam fit ambigua, priores formulae, pro x et y inuentae, posteriores pro X et Y iam sponte inuoluunt, ita ut eadem aequatio rationalis tam pro x et y quam pro X et Y necessario fit proditura. Ad hoc autem necesse est, ut neque Q neque R eandem formulam $\sqrt{(1+pp)}$ inuoluant, quia alioquin etiam signum harum litterarum mutari oporteret. Hinc igitur ista regula statui potest: ut pro Q functio rationalis ipsius p accipi debeat.

§. 10. Ut autem curvas algebraicas obtineamus, quia esse debet $R = \int p dQ = pQ - \int Q dp$, statuamus $\int Q dp = S$, denotante S functionem quaecunque rationalem ipsius p , eritque $Q = \frac{ds}{dp}$, hincque porro $R = \frac{pds}{dp} - S$. Nunc igitur pro curuis orbiformibus sequentes determinationes ambarum coordinatarum x et y exhibere possumus:

$$x = \frac{ds}{dp} + \frac{fp}{\sqrt{(1+pp)}}; \quad y = \frac{pds}{dp} - S - \frac{f}{\sqrt{(1+pp)}};$$

vbi pro S functionem quaecunque rationalem ipsius p , vel saltem talem, accipere possumus, quae, dum formula $\sqrt{(1+pp)}$ est ambigua, eundem valorem retineat.

§. 11. Quia natura orbis, qualem consideramus, postulat, ut curua sit in se rediens, et nusquam in infinitum porrigatur, functio S ita comparata esse debet, ut neque abscissa x neque applicata y vnquam fieri possit infinita, quem in finem hanc functionem S tali fractioni:

$$\frac{\alpha + \beta p + \gamma p p + \delta p^2 + \text{etc.}}{\lambda + B p + C p p + D p^2 + \text{etc.}}$$

aequari oportet, cuius denominator nullum habeat factorem simplicem realem; si enim factorem talem haberet, puta $p - n$, tum, sumto $p = n$, valor ipsius S fieret infinitus. Deinde summa potestas ipsius p in numeratore, haud debet esse maior quam in denominatore; aliter enim, casu $p = \infty$, valor ipsius S iterum in infinitum excreceret. Praeterea vero etiam exponentes fracti ipsius p admitti quidem possent, ita tamen, ut nullum membrum ambiguum obtineat valorem, quia alioquin eidem valori ipsius p plures tam abscissae quam applicatae conuenire possent; hoc enim casu curua non post vnam reuolutionem, sed demum post duas pluresue in se rediret; tum autem eius euoluta non amplius foret curua triangularis, sed vel pentagona, vel heptagona, vel enneagona vel etc. id quod instituto nostro aduersatur.

§. 12. Ex hac constructione generali, in qua continentur omnes curuae orbiformes, et quidem simplices, quae post vnam reuolutionem in se redeunt, facile erit formulas elicere pro descriptione curuarum triangularium; cum enim euolutae harum curuarum orbiformium certe sint figurae triangulares, tantum opus est, ut in euolutas istarum curuarum inquiramus. Quia autem omnes illae curuae, pro quouis valore litterae f , ex euolutione eiusdem curuae triangularis

ris nascuntur, littera f non in determinationem euolutae ingreditur; vnde in formulis nostris, pro x et y inuentis, partes, hanc litteram f inuoluentes, tuto omittere licebit; sicque pro hac inuestigatione habebimus tantum

$$x = \frac{ds}{dp} \text{ et } y = \frac{p ds}{dp} - S,$$

quam ob rem naturam euolutae, ex his valoribus oriundae, inuestigasse sufficiet.

Tab. I. §. 13. Sit igitur $FMfm$ talis curua, in qua sit
Fig. 6. abscissa $FP = x = \frac{ds}{dp}$, applicata $PM = y = \frac{p ds}{dp} - S$, et ducta normali Mm erit subnormalis

$$PN = py = \frac{p^2 ds}{dp} - pS$$

vnde fit recta

$$FN = \frac{ds}{dp} (1 + pp) - pS.$$

Ponamus nunc angulum $FN M = \Phi$, erit tang. $\Phi = \frac{y}{x}$, ideoque $p = \cot. \Phi = \frac{\cos. \Phi}{\sin. \Phi}$, vnde fit

$$\sin. \Phi = \frac{1}{\sqrt{(1+pp)}} \text{ et } \cos. \Phi = \frac{p}{\sqrt{(1+pp)}},$$

tum vero etiam $d\Phi = -\frac{dp}{1+pp}$. Quod si iam breuitatis gratia ponamus $FN = v$, notum est, centrum circuli, curuam in M osculantis, fore in puncto U , ita vt fit

$$NU = \frac{dv \sin. \Phi}{d\Phi};$$

Cum autem, sumto elemento dp constante, fit

$$dv = \frac{d ds}{dp} (1 + pp) + p ds - S dp \text{ et}$$

$$\frac{\sin. \Phi}{d\Phi} = -\frac{v(1+pp)}{dp}$$

erit recta

$$NU = -\frac{d ds}{dp^2} (1 + pp)^{\frac{3}{2}} - \frac{p ds}{dp} \sqrt{(1+pp)} + S \sqrt{(1+pp)}$$

pro qua formula breuitatis ergo scribamus r , ita vt fit $NU = r$.

§. 14. Inuento puncto U, quod erit in euoluta, quam quaerimus, inde ad axem ducamus perpendicularum UT, ac pro euoluta vocemus abscissam FT = t et applicatam TU = u; erit autem:

$$NT = NU \cos. \Phi = \frac{pr}{\sqrt{(1+pp)}} \text{ et}$$

$$TU = NU \sin. \Phi = \frac{r}{\sqrt{(1+pp)}}$$

vnde, loco r valorem assumtum substituendo, consequemur abscissam

$$t = FN + NT = \frac{ds}{dp} - \frac{p d ds}{d p^2} (1 + pp);$$

tum vero applicatam

$$u = S - \frac{p ds}{dp} - \frac{d ds}{d p^2} (1 + pp);$$

vnde colligimus

$$t - pu = \frac{ds}{dp} (1 + pp) - p S.$$

Ope igitur harum formularum, quaecunque functio idonea ipsius p pro S accipiatur, tam abscissam FT = t quam applicatam TU = u assignare poterimus, quibus curua triangularis determinatur. Valores autem idoneos, pro S accipiendos, supra indicauimus.

§. 15. Quo hanc inuestigationem exemplo illustremus, sumamus

$$S = \frac{ap}{1+pp}, \text{ eritque}$$

$$\frac{ds}{dp} = \frac{a(1-pp)}{(1+pp)^2} \text{ et } \frac{d ds}{d p^2} = \frac{2ap^2 - 5ap}{(1+pp)^3}$$

vnde colligimus

$$t = \frac{a+5app-2ap^4}{(1+pp)^2} \text{ et } u = \frac{6ap}{(1+pp)^2}.$$

Hinc primo patet, siue p sumatur positue siue negatiue, abscissam t eandem manere, applicatam vero u hoc casu in partem

contrariam cadere, vnde axis noster FT huius curvae erit diameter. Deinde, sumto $p = 0$ fiet $t = a$ et $u = 0$; at si capiatur p infinite paruum, fiet

$$t = a + 3 a p p \text{ et } u = 6 a p.$$

Porro, sumto $p = \frac{1}{2}$, erit $t = \frac{34}{25} a$ et $u = \frac{48}{25} a$; si autem $p = 1$ erit $t = a$ et $u = \frac{3}{2} a$. Sit denique $p = \infty$, eritque $t = -2 a$ et $u = 0$. Hinc patet, curuam huiusmodi figuram esse habituram, qualem in figura ei dedimus, ternas cuspides habentem, B, C, D, existente $FD = 2 a$ et $FA = a$. Pro alteris cuspidibus B et C quaeratur locus, vbi applicata u fit maxima, et cum sit

Tab. I.
Fig. 7.

$$d. \frac{p}{(1+pp)^2} = \frac{d p (1-3 p p)}{(1+pp)^3}$$

hoc eueniet, vbi $3 p p = 1$, siue $p = \frac{1}{\sqrt{3}}$; tum autem fiet abscissa $t = \frac{11}{8} a$ et $u = \frac{9\sqrt{3}}{8} a$. Ergo ducta chorda BC, axem secante in E, erit $FE = \frac{11}{8} a$ et $EB = EC = \frac{9\sqrt{3}}{8} a$. Quod si iam quoque ducantur chordae BD et CD, ob $DE = \frac{27}{8} a$ erit $BD^2 = \frac{972}{64} a a$, vnde fit $BD = CD = \frac{9\sqrt{3}}{8} a$; ex quo patet, chordas omnes BD, CD et BC esse inter se aequales. Referet ergo haec curua triangularis triangulum aequilaterum.

Tab. I.
Fig. 6.

§. 16. Accuratus autem in symptomata nostrae curuae triangularis inquiramus, et quoniam pro coordinatis $FT = t$ et $TU = u$ has inuenimus formulas:

$$t = \frac{d s}{d p} - \frac{p d d s}{d p^2} (1 + p p) \text{ et}$$

$$u = S - \frac{p d s}{d p} - \frac{d d s}{d p^2} (1 + p p)$$

primum obseruo, rectam NU esse tangentem curuae in puncto U, quae cum ad axem sit inclinata angulo $TNU = \Phi$, cuius cotangens est p , necesse est vt fit $\frac{d u}{d t} = \text{tag. } \Phi = \frac{1}{p}$, vnde fit

$$d t =$$

$dt = p du$. Est vero per formulas

$$dt = -\frac{p p' dds - p(1 + pp') d^2 s}{d p^2} \text{ et}$$

$$p du = -\frac{p p' dds - p(1 + pp') d^2 s}{d p^2}.$$

ideoque reuera $dt = p du$.

§. 17. Quia igitur est $dt = p du$, iisdem casibus, quibus fit $\frac{dt}{dp} = 0$, etiam fiet $\frac{du}{ds} = 0$; vnde patet, ubicunque abscissa t fuerit, vel maxima vel minima, ibidem quoque fore applicatam maximam vel minimam, quae proprietates utique in cuspides conuenit. Ex quo colligimus, ubicunque ambae cooordinate p et q simul fiunt vel maximae vel minimae, ibi quoque existere cuspides nostrae curuae; quare cum curua habeat tres cuspides, in tribus quoque locis tam t quam u maximum fieri necesse est.

§. 18. Imprimis autem hic notatu dignum occurrit, nostram curuam triangularem esse rectificabilem, quippe cuius arcus aequalis est radio osculi $M U$ curuae orbiformis, vnde est nata. Vidimus autem esse

Tab. I.
Fig. 6.

$$NU = r = -\frac{d ds}{d p^2} (1 + pp')^{\frac{3}{2}} - \frac{p ds}{d p} \sqrt{1 + pp'}$$

$$+ S \sqrt{1 + pp'}; \text{ at } MN = y \sqrt{1 + pp'}$$

$$= \frac{p ds \sqrt{1 + pp'}}{d p} - S \sqrt{1 + pp'},$$

vnde fit radius osculi

$$MU = \frac{p ds}{d p^2} (1 + pp')^{\frac{3}{2}},$$

qui ergo longitudinem nostrae curuae triangularis exprimit; id quod etiam patet ex proprietate supra obseruata, quod fit $dt = p du$, vnde fit elementum curuae

$$\sqrt{dr}$$

$$\sqrt{dt^2 + du^2} = du \sqrt{1 + pp} =$$

$$-\frac{3pd \, ds}{a p} \sqrt{1 + pp} - \frac{d^3 s}{a p^2} (1 + pp)^{\frac{3}{2}}$$

cujus integrale manifesto est

$$-\frac{d \, ds}{a p^2} (1 + pp)^{\frac{3}{2}}.$$

§. 19. Quoniam hic tantum curvas triangulares inuestigare instituimus, parum solliciti, vtrum sint rectificabiles nec ne, dummodo fuerint algebraicae: hac conditione omiffa simpliciores formulas pro coordinatis t et u exhibere, atque adeo, sine vlllo respectu ad curvas orbiformes habito, directe ex ipsa indole harum curvarum elicere poterimus. Cum enim esse debeat $dt = p \, du$, erit $t = \int p \, du = pu - \int u \, dp$. Iam statuamus $\int u \, dp = \Pi$, ita vt fit $u = \frac{d \, \Pi}{d p}$, vnde fit $t = \frac{p \, d \, \Pi}{d p} - \Pi$; vbi pro Π eiusmodi functiones ipsius p accipi debent, quae nullo casu fiant infinitae, quicunque valores literae t tribuantur, cuiusmodi functiones iam supra descripsimus; tum vero etiam hae functiones Π nulla signa radicalia, quae ambiguitatem involuant, inuoluere debent. Imprimis autem necesse est, vt ambae coordinatae t et u tribus casibus fiant maximae vel minimae, id quod eueniet, si, ob $u = \frac{d \, \Pi}{d p}$, haec aequatio: $\frac{d \, d \, \Pi}{d p^2} = 0$, tres habeat radices reales, neque vero plures.

§. 20. Sumamus exempli gratia $\Pi = \frac{a + b p}{1 + f p + g p p}$, quae nullo casu fit infinita, si modo fuerit $ff < 4g$; tum autem erit

$$\frac{d \, \Pi}{d p} = \frac{b - a f - 2 a g p - b g p p}{(1 + f p + g p p)^2} = u$$

hincque

$t = -$

$$x = \frac{-a - 2afp - 2agp^2 - 2bgp^3}{(1 + fp + gp^2)^2}$$

Vt iam ternas cuspides definiamus, consideremus aequationem $\frac{du}{dp} = 0$, quod quo facilius fieri possit ponamus

$$u = \frac{A + Bp + Cp^2}{(1 + fp + gp^2)^2}$$

ita ut sit $A = b - af$; $B = -2ag$; $C = -bg$; tunc vero hinc reperitur sequens aequatio:

$$B - 2Af + (2C - Bf - 4Ag)p - 3Bgp - 2Cgp^2 = 0$$

cuius tres radices nobis ternas cuspides monstrabunt.

§. 21. Ponamus iam huius aequationis radices esse: I°. $p = \alpha$, II°. $p = \beta$ ac III°. $p = \gamma$, sine acquemus formulam inuentum huic producto:

$$2Cg(\alpha - p)(\beta - p)(\gamma - p)$$

quod euolutum praebet

$$2Cg\alpha\beta\gamma - 2Cg(\alpha\gamma + \alpha\beta + \beta\gamma)p + 2Cg(\alpha + \beta + \gamma)p^2 - 2Cgp^3$$

quae forma, inuentae aequata, sequentes tres producit determinationes:

$$I°. B - 2Af = 2Cg\alpha\beta\gamma;$$

$$II°. 2C - Bf - 4Ag = -2Cg(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma);$$

$$III°. -3Bg = 2Cg(\alpha + \beta + \gamma);$$

ex quarum tertia fit $B = -\frac{2}{3}C(\alpha + \beta + \gamma)$; ex prima vero

$$A = -\frac{1}{3}C(\alpha + \beta + \gamma) - \frac{1}{3}Cg\alpha\beta\gamma,$$

qui valores in secunda substituti praebent

$$2C + \frac{(2ff + 4g)}{3f}C(\alpha + \beta + \gamma) + \frac{4g}{3}Cg\alpha\beta\gamma = -2Cg(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)$$

quae aequatio, per $\frac{3f}{2C}$ multiplicata, abit in hanc:

$$3f + (ff + 2g)(\alpha + \beta + \gamma) + 6gg\alpha\beta\gamma = -3fg(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)$$

haecque aequationes omnes continent determinationes, quibus nostro proposito satisfit.

§. 22. Antequam hanc determinationem in genere ulterius prosequamur, evoluamus casum specialem, quo

$$\gamma = 0 \text{ et } \beta = -\alpha, \text{ vnde fit } \alpha\beta\gamma = 0;$$

$$\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = -\alpha^2 \text{ et } \alpha + \beta + \gamma = 0,$$

eritque postrema aequatio $3f = 3\alpha\alpha fg$, siue $f = \alpha\alpha fg$; vnde sequitur vel $f = 0$, vel $g = \frac{1}{\alpha\alpha}$. Consideremus primo casum $f = 0$, fietque $A = -\frac{1}{\alpha}$, vnde littera A non determinatur, vel potius fit $A = 0$, porroque $B = 0$, vnde colligitur $b = 0$, siue etiam b non determinatur; tum vero erit $a = 0$. Quia autem aequationem postremam per f multiplicauimus, hic valor $f = 0$ lubricus est habendus. Sumamus igitur alterum valorem $g = \frac{1}{\alpha\alpha}$, et quia debet esse $ff < 4g$, sequitur esse debere $f < \frac{2}{\alpha}$; hinc vero fiet $A = 0$ et $B = 0$, ideoque $b - af = 0$, et $-2ag = 0$, vnde fit $a = 0$.

§. 23. Sufficiat autem haec in genere indicasse, et consideremus potius casum magis determinatum, fumendo

$$\Pi = \frac{bp}{\alpha\alpha + pp}, \text{ vnde fit } \frac{d\Pi}{dp} = u = \frac{b(\alpha\alpha - pp)}{(\alpha\alpha + pp)^2} \text{ et}$$

$$t = \frac{2b p^3}{(\alpha\alpha + pp)^2}.$$

Quod si iam pro cuspidibus faciamus $\frac{d\Pi}{dp} = 0$, nascitur haec aequatio: $p^3 - 3\alpha\alpha p = 0$, cuius ternae radices sunt

$$\text{I}^\circ. p = 0; \text{II}^\circ. p = +\alpha\sqrt{3}; \text{III}^\circ. p = -\alpha\sqrt{3};$$

pro quarum prima habebimus $t = 0$ et $u = \frac{b}{\alpha\alpha}$;

pro secunda:

$$t = \frac{3b\sqrt{3}}{\alpha} \text{ et } u = -\frac{b}{\alpha\alpha};$$

pro tertia vero:

$$t = -\frac{3b\sqrt{3}}{\alpha} \text{ et } u = -\frac{b}{\alpha\alpha};$$

vnde

vnde curua habebit formam in figura 8 delineatam, vbi est

$$FB = \frac{b}{\alpha\alpha}, FG = FH = \frac{3b\sqrt{3}}{8\alpha} \text{ ac}$$

Tab. I.
Fig. 8.

$$GC = HD = \frac{+b}{8\alpha\alpha},$$

ficque ternae cuspides erunt in punctis B, C, D, ac ductis chordis erit

$$BC = BD = \frac{3b\sqrt{3}(\frac{3}{8} + \alpha\alpha)}{8\alpha\alpha} \text{ et } CD = \frac{3b\sqrt{3}}{4\alpha},$$

ita vt haec figura triangularis triangulum isosceles exhibeat.

§. 24. Euoluamus simili modo casum $\Pi = \frac{a}{\alpha\alpha + pp}$

vnde fit

$$\frac{d\Pi}{d p} = u = -\frac{2ap}{(\alpha\alpha + pp)^2}, \text{ hincque } t = -\frac{a(\alpha\alpha + 3bp)}{(\alpha\alpha + pp)^2}.$$

Nunc pro cuspidibus fiat

$$\frac{d u}{d p} = -\frac{2a(\alpha\alpha - 3bp)}{(\alpha\alpha + pp)^3} = 0,$$

quae aequatio tantum duas praebet radices

$$p = +\frac{\alpha}{\sqrt{3}} \text{ et } p = -\frac{\alpha}{\sqrt{3}};$$

tertia autem radix est $p = \infty$. Hinc igitur pro prima cuspidis, quae fit vbi $p = \infty$, fit $t = 0$ et $u = 0$, ficque haec cuspidis B cadit in ipsum punctum F. Pro secunda cuspidis sumatur

Fig. 9.

$$p = \frac{\alpha}{\sqrt{3}}, \text{ eritque } t = -\frac{p a}{8\alpha\alpha} \text{ et } u = -\frac{3a\sqrt{3}}{8\alpha^3}.$$

Pro tertia cuspidis fit

$$p = -\frac{\alpha}{\sqrt{3}}, \text{ erit } t = +\frac{p a}{8\alpha\alpha} \text{ et } u = +\frac{3a\sqrt{3}}{8\alpha^3}.$$

Sumto igitur $FG = \frac{p a}{8\alpha\alpha}$ binae reliquae cuspides erunt in C et D, ita vt fit $GC = GD = \frac{3a\sqrt{3}}{8\alpha^3}$, ideoque earum distantia

$$CD = \frac{3a\sqrt{3}}{4\alpha^3}, \text{ vnde colligitur}$$

$$BC = BD = \frac{3a\sqrt{3}(\alpha\alpha + \frac{3}{8})}{8\alpha^3}$$

C 2

ficque

sequere erit

$$CD:BC = 2 : \sqrt{3\alpha\alpha + 1}$$

ex quo patet, casu $\alpha = 1$ triangulum fore aequilaterum.

§. 25. Quod si ergo ambo casus praecedentes combinentur, ita ut statuatur $\Pi = \frac{a + bp}{\alpha\alpha + pp}$, tum tam abscissa t quam applicata u aequabitur summae ambarum praecedentium formularum, ita ut sit

$$t = \frac{2bp^2 - a(\alpha\alpha + pp)}{(\alpha\alpha + pp)^2} \text{ et } u = \frac{b(\alpha\alpha - pp) - 2ap}{(\alpha\alpha + pp)^2};$$

unde si pro cuspidibus inveniendis ponamus $\frac{du}{dp} = 0$, habebimus hanc aequationem:

$$2bp^3 - 6b\alpha\alpha p - 2a\alpha\alpha + 6app = 0, \text{ siue } bp^3 + 3app - 3b\alpha\alpha p - a\alpha\alpha = 0,$$

cuius ergo ternas radices quaeri oportet, quod cum per regulam *Cardani* difficulter praestetur, trisectione anguli utamur, quem in finem fingamus esse $p = r + s \cos. \Phi$, eritque

$$pp = rr + \frac{1}{2}ss + 2rs \cos. \Phi + \frac{1}{2}ss \cos. 2\Phi \text{ et}$$

$$p^3 = r^3 + \frac{3}{2}rss + (3rrs + \frac{3}{4}s^3) \cos. \Phi + \frac{3}{2}rss \cos. 2\Phi + \frac{1}{4}s^3 \cos. 3\Phi$$

quibus valoribus substitutis aequatio nostra transmutabitur in sequentem:

$$+br^3 + 3brrs \cos. \Phi + \frac{3}{2}brss \cos. 2\Phi + \frac{1}{4}bs^3 \cos. 3\Phi$$

$$+ \frac{3}{2}brss + \frac{3}{4}bs^3 \cos. \Phi + \frac{3}{2}ass \cos. 2\Phi$$

$$+ 3arr + 6ars \cos. \Phi$$

$$+ \frac{3}{2}ass - 3baas \cos. \Phi$$

$$- 3baar$$

$$- a\alpha\alpha.$$

Nunc definiantur litterae r et s ita, ut membra intermedia,

dia, tam $\cos. \Phi$ quam $\cos. 2 \Phi$ involuentia, seorsim evanescent, unde hae duae aequationes oriuntur:

$$I^a. 3 b r r s + \frac{3}{4} b s^3 + 6 a r s - 3 b a a s = 0;$$

$$II^a. \frac{3}{2} b r s s + \frac{3}{2} a s s = 0;$$

ex quarum posteriore fit $r = -\frac{a}{b}$, qui valor in priore substitutus dat

$$\frac{3 a a s}{b} + \frac{3}{4} b s^3 - \frac{6 a a s}{b} - 3 b a a s = 0, \text{ unde fit}$$

$$s s = \frac{4 (b b a a + a a)}{b}, \text{ ideoque } s = \frac{2 \sqrt{(b b a a + a a)}}{b}.$$

Hi iam valores in nostra aequatione substituuntur, fietque

$$\frac{2 a^3}{2 b} + 2 a a a + \frac{1}{2} b s^3 \cos. 3 \Phi = 0,$$

unde fit

$$\cos. 3 \Phi = -\frac{3 a (a a + b b a a)}{b^3 s^3} = -\frac{a}{\sqrt{(a a + b b a a)}}.$$

Quaeratur igitur angulus ω , cuius Cofinus fit

$$= -\frac{a}{\sqrt{(a a + b b a a)}}$$

qui Cofinus cum etiam conveniat angulis $-\omega$; $2 \pi - \omega$; item $2 \pi + \omega$, habebimus sequentes valores:

$$I^o. 3 \Phi = \omega, II^o. 3 \Phi = -\omega, III^o. 3 \Phi = 2 \pi - \omega,$$

$$IV. \text{ et } 3 \Phi = 2 \pi + \omega;$$

unde omisso secundo valore, quippe qui a primo non discrepat, tres valores pro angulo Φ erunt

$$I^o. \Phi = \frac{1}{3} \omega, II^o. \Phi = 120^\circ - \frac{1}{3} \omega \text{ et } III^o. \Phi = 120^\circ + \frac{1}{3} \omega,$$

quibus inuentis terni valores litterae p erunt

$$I^{us}. p = -\frac{a}{b} + \frac{2 \sqrt{(b b a a + a a)}}{b} \cos. \frac{1}{3} \omega,$$

$$II^{us}. p = -\frac{a}{b} + \frac{2 \sqrt{(b b a a + a a)}}{b} \cos. (120^\circ - \frac{1}{3} \omega),$$

$$III^{us}. p = -\frac{a}{b} + \frac{2 \sqrt{(b b a a + a a)}}{b} \cos. (120^\circ + \frac{1}{3} \omega).$$

§. 26. His casibus euolutis reuertamur ad quaestionem nostram generalem, qua eiusmodi curuae triangulares quaeruntur, in quibus pro cuspidibus littera p ternos datos obtineat valores, scilicet: $p = a$, $p = \beta$ et $p = \gamma$. Nunc autem primo ponamus breuitatis gratia $a + \beta + \gamma = \zeta$; $a\beta + a\gamma + \beta\gamma = \eta$ et $a\beta\gamma = \theta$, et tres aequationes adimplendae erunt

$$\text{I}^\circ. B - 2 Af = 2 C g \theta.$$

$$\text{II}^\circ. 2 C - Bf - 4 Ag = -2 C g \eta.$$

$$\text{III}^\circ. -3 Bg = 2 C g \zeta.$$

Cum igitur esset

$$A = b = af, B = -2ag \text{ et } C = -bg,$$

hinc ternae nostrae aequationes erunt

$$\text{I}^\circ. -ag - bf + aff = -bgg\theta$$

$$\text{II}^\circ. -3b + 3af = bg\eta$$

$$\text{III}^\circ. 3a = -b\zeta;$$

ex quibus statim ternos valores pro fractione $\frac{a}{b}$ nanciscimur, qui sunt:

$$\text{I}^\circ. \frac{a}{b} = \frac{f - g\theta}{f - g}; \text{II}^\circ. \frac{a}{b} = \frac{g\eta + 3}{3f} \text{ et } \text{III}^\circ. \frac{a}{b} = -\frac{\zeta}{3}.$$

§. 27. Quod si iam horum valorum secundus et tertius inter se aequentur, prodibit $f = -\frac{g\eta - 3}{2}$. Aequetur nunc primus valor etiam tertio, et erit

$$3f - 3gg\theta = -ff\zeta + g\zeta,$$

vbi, si loco f valor modo inuentus substituatur, prodibit

$$3g\eta - 3gg\zeta\theta = g\zeta\zeta - gg\eta\eta$$

quae aequatio per g diuisa dat

$$3\eta - 3g\zeta\theta = \zeta\zeta - g\eta\eta, \text{ vnde concluditur}$$

$g =$

$$g = \frac{\zeta \eta - \zeta \zeta}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta}, \text{ hincque porro } f = \frac{\zeta \eta - \theta \theta}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta}.$$

§. 28. His valoribus inuentis denominator supra assumtus $1 + fp + gpp$ hanc induet formam:

$$\frac{\zeta \zeta \theta - \eta \eta + (\zeta \eta - \theta \theta) p + (\zeta \eta - \zeta \zeta) pp}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta}$$

in quo esse debet $ff < 4g$. Est vero

$$ff = \frac{\zeta \zeta \eta \eta - 18 \zeta \eta \theta + 81 \theta \theta}{(\zeta \zeta \theta - \eta \eta)^2} \text{ et}$$

$$4g = \frac{12 \eta - 4 \zeta \zeta}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta} = \frac{36 \zeta \eta \theta - 12 \zeta \zeta \theta - 12 \eta^2 + 4 \zeta \zeta \eta \eta}{(\zeta \zeta \theta - \eta \eta)^2}$$

Necesse igitur est vt fit

$\zeta \zeta \eta \eta - 18 \zeta \eta \theta + 81 \theta \theta < 36 \zeta \eta \theta - 12 \zeta \zeta \theta - 12 \eta^2 + 4 \zeta \zeta \eta \eta$
quod sine dubio sponte euenit. Pro numeratore sumamus

$$a = -\frac{\zeta c}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta} \text{ et } b = \frac{sc}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta}$$

ita vt fractio pro Π assumenda fit

$$\Pi = \frac{-\zeta c + sc p}{\zeta \zeta \theta - \eta \eta + (\zeta \eta - \theta \theta) p + (\zeta \eta - \zeta \zeta) pp}$$

Cum autem semper fit $\zeta \zeta > 3 \eta$ et $\eta \eta > 3 \zeta \theta$, concinnius hic valor ita exprimetur:

$$\Pi = \frac{\zeta c - sc p}{\eta \eta - \zeta \zeta \theta + (\theta \theta - \zeta \eta) p + (\zeta \zeta - 3 \eta) pp}$$

§. 29. Quia positio axis penitus arbitrio nostro relinquitur, eum semper ita assumere licet, vt vnā cuspidem tangat, tum vero ibi fiet $p = \infty$, vnde solutio nostra non minus late patebit, etiamsi ponamus $\alpha = \infty$; tum vero erit

$$\zeta = \alpha, \eta = \alpha (\beta + \gamma) \text{ et } \theta = \alpha \beta \gamma;$$

hincque propterea

$$\eta \eta - 3 \zeta \theta = \alpha \alpha (\beta \beta - \beta \gamma + \gamma \gamma);$$

$$9 \theta - \zeta \eta = 9 \alpha \beta \gamma - \alpha \alpha (\beta + \gamma) = -\alpha \alpha (\beta + \gamma) \text{ et}$$

$$(\zeta \zeta - 3 \eta) = \alpha \alpha - 3 \alpha (\beta + \gamma) = \alpha \alpha.$$

Suma-

Sumatur igitur $c = \alpha a$, ut numerator etiam per αa fiat diuisibilis, eritque formula nostra

$$\Pi = \frac{a}{\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma - (\beta + \gamma)p + p^2}$$

cuius denominator certe nullum habet factorem realem, nisi sit $\beta = \gamma$, quem casum autem ipsa rei natura respuit. Hoc autem valore pro Π assumpto consequimur statim

$$u = \frac{d\Pi}{a p} = \frac{a(\beta + \gamma) - 2\alpha p}{(\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma - (\beta + \gamma)p + p^2)^2} \text{ et}$$

$$t = p u - \Pi = \frac{-a(\beta\beta - \beta\gamma - \gamma\gamma) + 2\alpha(\beta + \gamma)p - 3\alpha p p}{(\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma - (\beta + \gamma)p + p^2)^2}$$

§. 30. Ut iam hinc cuspides definiamus, pro prima cuspide ponamus $p = \infty$, eritque tam $t = 0$, quam $u = 0$. Pro secunda cuspide sumamus $p = \beta$, eritque abscissa

$$t = -\frac{a(2\beta - \gamma)}{(\beta - \gamma)^2} \text{ et } u = -\frac{a}{(\beta - \gamma)^2}$$

Pro tertia vero cuspide fiat $p = \gamma$, et erit

$$t = -\frac{a(\beta - 2\gamma)}{(\beta - \gamma)^2} \text{ et } u = +\frac{a}{(\beta - \gamma)^2}$$

Tab. II. Hinc in figura erit $GB = \frac{a}{(\beta - \gamma)^2}$,

Fig. 10. $AH = \frac{a(\beta - 2\gamma)}{(\beta - \gamma)^2}$ et $HC = \frac{a}{(\beta - \gamma)^2}$.

§. 31. Ductis iam chordis AB, AC et BC erit

$$AB = \frac{a}{(\beta - \gamma)^2} \sqrt{(2\beta - \gamma)^2 + 1} \text{ et}$$

$$AC = \frac{a}{(\beta - \gamma)^2} \sqrt{(\beta - 2\gamma)^2 + 1}.$$

Pro tertia chorda BC cum sit

$$BC^2 = (BG + HC)^2 + GH^2 = \frac{4a^2 + a^2(\beta + \gamma)^2}{(\beta - \gamma)^2}$$

hinc erit

$$BC = \frac{a}{(\beta - \gamma)^2} \sqrt{4 + (\beta + \gamma)^2},$$

sicque tres istae chordae AB, AC et BC eandem inter se

se tenebunt rationem, quam habent hae tres formulae radicales:

$$\sqrt{(2\beta - \gamma)^2 + 1}, \sqrt{\beta - 2\gamma)^2 + 1}, \sqrt{4 + (\beta + \gamma)^2}.$$

Pro positione autem harum chordarum notetur esse tangens ang. $BAG = \frac{1}{2\beta - \gamma}$ et tang. ang. $CAH = \frac{1}{\beta - 2\gamma}$, unde colligitur tangens anguli BAC

$$\frac{1}{2\beta - \gamma} + \frac{1}{\beta - 2\gamma} = \frac{\beta - 2\gamma + 2\beta - \gamma}{2\beta - \beta\gamma + 2\gamma\gamma - 1}.$$

Pro tertia chorda erit tang. anguli $AOC =$

$$\text{tang. } BOG = \frac{BG + CH}{GH} = \frac{1}{\beta + \gamma}.$$

Summigitur fit $ABC = GOB - GAB$ erit

$$\text{tang. } ABC = \frac{2\beta + 2\gamma}{(\beta + \gamma)(2\beta - \gamma)}.$$

Denique, ob anguli COG

$$\text{tang. } = -\text{tang. ang. } BOG = -\frac{1}{\beta + \gamma}, \text{ quia est ang. } ACB = COG = CAO, \text{ erit tang. } ACB = \frac{2\gamma - 2\beta}{(\beta - \gamma)(\beta - 2\gamma) - 2}.$$

§. 32. Statuamus exempli gratia $\beta = 2$ et $\gamma = 1$ Tab. II.

erit $BAG = 2$ et $CAH = 0$, tum vero $GB = a$ et Fig. II.

$HC = a$, unde curva figuram habebit, qualis fig. II. repraesentatur, in qua ergo si capiatur punctum quodcumque u , cuius coordinatae sunt AT et TU , erit

$$T = \frac{a - 3ap + 3a^2p^2}{(2 - 3p + 2p^2)^2} \text{ et } u = \frac{3a - 2ap}{(2 - 3p + 2p^2)}.$$

Hic in ramo AUC id punctum notatu est dignum, quod a recta AC maxime distat; hoc igitur manifesto ibi erit, ubi eius tangens ad axem est normalis, ideoque hoc loco erit $p = 0$; unde fit $AT = \frac{1}{3}a$, quae est distantia maxima quaerita US ; tum vero, erit $TU = u = \frac{1}{3}a$. Quia tangens anguli $GAB = 2$ in arcu AB id punctum a chorda AB maxime erit remotum, cuius tangens chordae AB est parallela; pro eo ergo reperitur $p = 3$, unde

de fit $A T = t = \frac{1}{2} a$ et $T U = u = -\frac{1}{2} a$. Ex hoc exemplo autem luculenter patet, quemadmodum omnes casus euolui conueniat; neque vero difficile erit, hinc eiusmodi curuas triangulares inuenire, quae dato triangulo $A B C$ sint inscriptibiles, quandoquidem ex ratione laterum trianguli innotescit ratio harum formularum:

$$\sqrt{(2\beta - \gamma)^2 + 1}; \sqrt{(\beta - 2\gamma)^2 + 1}; \sqrt{4 + (\beta + \gamma)^2}.$$

§. 33. Sint terna latera $A B$, $A C$ et $B C$ inter se vt numeri A , B , C , ac ponatur

$$\sqrt{(2\beta - \gamma)^2 + 1} = n A, \sqrt{(\beta - 2\gamma)^2 + 1} = n B \text{ et}$$

$$\sqrt{4 + (\beta + \gamma)^2} = n C;$$

unde sumtis quadratis fit

$$(2\beta - \gamma)^2 = n n A A - 1; (\beta - 2\gamma)^2 = n n B B - 1 \text{ et}$$

$$(\beta + \gamma)^2 = n n C C - 4,$$

unde fit

$$1^\circ. 2\beta - \gamma = \sqrt{n n A A - 1}; 2^\circ. \beta - 2\gamma = \sqrt{n n B B - 1} \text{ et}$$

$$\beta + \gamma = \sqrt{n n C C - 4},$$

quarum prima dempta secunda praebet

$$\sqrt{n n A A - 1} - \sqrt{n n B B - 1} = \sqrt{n n C C - 4},$$

ex qua aequatione quantitatem n definire oportet, qua inuenta reperietur

$$3 \beta = \sqrt{n n A A - 1} + \sqrt{n n C C - 4} \text{ et}$$

$$3 \gamma = \sqrt{n n C C - 4} - \sqrt{n n B B - 1};$$

quibus inuentis curua triangularis satisfaciens per formulas superiores facile determinatur; ex illa autem aequatione elicitur

$$n n = \frac{4(2AA + 2BB - CC)}{2AAB + 2AAC + 2BBC - A^2 - B^2 - C^2}$$

Vnde si trianguli, cuius latera sunt A, B et C, area vocetur Δ, hic denominator erit = 16 Δ Δ, ita vt fit

$$n n = \frac{2AA + 2BB - CC}{4 \Delta \Delta}$$

Hoc autem valore inuento erit

I. $\sqrt{n n A A - 1} = \frac{5AA + BB - CC}{4 \Delta}$,

II. $\sqrt{n n B B - 1} = \frac{5BB + AA - CC}{4 \Delta}$ et

III. $\sqrt{n n C C - 4} = \frac{5AA - 5BB + CC}{4 \Delta}$,

ex his vero denique elicitur

$$3b = \frac{5AA - BB - CC}{4 \Delta} \text{ et } 3\gamma = \frac{AA - 5BB + CC}{4 \Delta},$$

ita vt iam omnia sint determinata, quae ad solutionem huius problematis spectant. Proposito scilicet quocumque triangulo rectilineo, semper curva triangularis describi potest, cuius cuspides in eius angulos incidant, et latera trianguli simul sint chordae arcuum, quibus figura triangularis constat.

§. 34. Ecce igitur, Problematis, cui tota haec investigatio erat destinata, concinnam solutionem subiungamus.

Problema.

Intra datum triangulum A B C curuam triangu- Tab. II.
larem continuam et algebraicam inscribere, cuius singulae Fig. 12.
cuspides in ipsos angulos trianguli A, B et C incidant.

D 2

Solu-

Solutio.

1°. Vocentur latera trianguli dati.

$$BC = a, AC = c \text{ et } AB = b,$$

fitque area huius trianguli $= \Delta$, ita vt fit

$$16 \Delta \Delta = 2 a a b b + 2 a a c c + 2 b b c c - a^4 - b^4 - c^4,$$

siue

$$16 \Delta \Delta = (a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a);$$

tum singula latera trianguli bifecentur in punctis a, b et c et rectae Aa, Bb, Cc , quae se mutuo in centro grauitatis trianguli O interfecabunt, erunt tangentes curuae triangularis in suis cuspidibus A, B et C . Iam, sumpta recta Aa pro axe, ponatur anguli BOa cotangens $= \beta$ et anguli COa cotangens $= -\gamma$, atque ex formulis ante inuentis, scribendo loco litterarum A, B et C has minusculas b, c et a , colligitur

$$\beta = \frac{bb - aa - cc}{2\Delta} \text{ et } \gamma = \frac{aa + bb - cc}{2\Delta},$$

ita vt fit

$$\beta + \gamma = \frac{b.b - c.c}{2\Delta}.$$

II°. Nunc capiatur

$$\Pi = \frac{k}{\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma - (\beta + \gamma)p + p^2},$$

unde fiet

$$u = \frac{k(\beta + \gamma) - k p}{(\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma - (\beta + \gamma)p + p^2)^2};$$

tum vero

$$t = p u - \Pi = \frac{-k(\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma) + 2k(\beta + \gamma)p - 2k p p}{(\beta\beta - \beta\gamma + \gamma\gamma - (\beta + \gamma)p + p^2)^2},$$

vbi t et u sunt coordinatae pro curua triangulari quaesita. Sumto enim eius puncto quocunque U , indeque demisso

in axem Aa perpendicularo UT , erit $AT = t$ et $TU = u$.
 Tantum igitur superest, ut quantitas k ita determinetur,
 ut curva triangularis tota intra triangulum ABC cadat,
 simulque eius cuspides in angulos ipsos A , B et C in-
 cidant; sponte autem prima cuspis in punctum A incidit,
 quia sumto $p = \infty$ fit tam $t = 0$ quam $u = 0$.

III°. Pro secunda igitur cuspide, quae in punctum
 B cadere debet, assumamus $p = \beta$, quo facto fiet

$$t = \frac{-k(\beta - \gamma)(2\beta - \gamma)}{(\beta - \gamma)^2} = \frac{k(2\beta - \gamma)}{(\beta - \gamma)^2}, \text{ et}$$

$$u = \frac{-k}{(\beta - \gamma)^2}. \text{ Necessse igitur est ut fiat}$$

$$tt + uu = bb, \text{ unde fit}$$

$$\frac{k^2(2\beta - \gamma)^2 - k^2}{(\beta - \gamma)^4} = bb, \text{ ideoque } k = \frac{b(\beta - \gamma)^2}{\sqrt{(2\beta - \gamma)^2 + 1}}$$

IV°. Est vero

$$\beta - \gamma = \frac{2(bb + cc) - aa}{\Delta} \text{ et } 2\beta - \gamma = \frac{2bb + cc - aa}{\Delta},$$

hinc igitur erit

$$(2\beta - \gamma)^2 + 1 = \frac{2b^2 + 2bbcc - aab^2}{\Delta^2},$$

hinc

$$\sqrt{(2\beta - \gamma)^2 + 1} = \frac{b\sqrt{(2bb + 2cc - aa)}}{\Delta},$$

quibus valoribus substitutis reperitur

$$k = \frac{(2bb + 2cc - aa)^{\frac{5}{2}}}{108\Delta\Delta},$$

qua quantitate cognita adepti sumus aequationem algebrai-
 cam pro curua triangulari, inscribenda triangulo ABC ,
 quam desideramus.

Corollarium.

Ex tali autem curua triangulari facillime innume-
rabiles curuae orbiformes formari possunt. Positis enim
coordinatis curuae orbiformis x et y , sumi poterit

$$x = u + \frac{ep}{\sqrt{(1+p^2)}} \text{ et } y = t - \frac{e}{\sqrt{(1+p^2)}},$$

quae ergo etiam erit algebraica; neque vero illa curua
triangularis huius erit euoluta, sed potius cum omnibus
his curuis orbiformibus communem habebit euolutam,
quae itidem erit curua triangularis, simulque rectificabilis.