

I.

Statica.

1. **Definitio 1.** *Statica* est scientia aequilibrii potentiarum cuius objecto applicatarum.
2. **Definitio 2.** *Potentia* est vis, quae cuivis objecto applicata, id movere conatur.
3. **Definitio 3.** *Directio potentiae* est linea, secundum quam potentia motum imprimere conatur.
4. **Definitio 4.** *Aequilibrium* est dispositio potentiarum objecto applicatarum, id in quiete seryans.
5. **Coroll.** Cum quaevis potentia conetur objectum mouere (2), in statu autem aequilibrii objectum quiescat (4), sequitur tum cujuslibet potentiae actionem a reliquis impediri.
6. **Theorema 1.** Vis gravitatis est potentia.

Demonstratio. Vis gravitatis causa est, quod omnia corpora gravia conentur descendere deorsum; ergo ea movere conatur; consequenter (2) vis gravitatis est potentia. Q. E. D.

7. **Coroll.** Cum vis gravitatis conetur deorsum mouere gravia, ejus directio est linea verticalis (3).

8. **Definitio 5.** Vis, qua gravia deorsum descendere conantur, vocatur *podus*.

9. **Problema 1.** Operi ponderis efficere, ut datum objectum conetur deorsum descendere.

Solutio. Fig. 1. Sit objectum *datum A*, alligetur ei filum, filoque corpus grave *P*. Cum grave *P* conetur deorsum descendere, filum tendet, neque ipsa etiam objectum *A* conatur abripere, quare hoc modo objectum *A* conabitur descendere. Q. E. F.

10. **Coroll. 1.** Objectum ergo *A* tanta vi conabitur descendere, quanta ipsum grave *P*.

11. **Coroll. 2.** Efficere potest, ut datum objectum data vi conetur descendere, ope gravis datam habentis vim.

12. **Problema 2.** Ope ponderis efficere, ut datum objectum secundum datam directionem antecederet conetur.

Solutio. Fig. 2. Sit objectum *A*; dataque directio *AB*; in ea directione subicinque firmetur clavus *B*, et filum ipsi *A* applicatum ducatur super *B*, eique tum alligetur pondus seu grave *P*.

Quia hoc grave conatur descendere, tendet ipsum PBA , eoque ipso conabitur objectum A secum abripere, idque in directione filii AB , id est, in directione data; quare objectum hoc modo conabitur secundum directionem AB incedere. Q. E. F.

13. **Coroll. 1.** Patet hinc etiam objectum A tanta vi conari in directione AB promoveri, quanta vi P tendit descendere.

14. **Coroll. 2.** Ergo effici potest, ut A secundum datam directionem data vi conetur moveri, applicando grave tanta vi deorsum tendens.

15. **Coroll. 3.** Potest igitur quaecunque potentia et quamcunque habens directionem ad pondus reduci, quia inveniri potest pondus faciens, ut objectum data vi in data directione incedere conetur (14).

16. **Scholion 1.** Haec de ponderibus ideo adjeci, ut in posterum quae de potentiis inventientur et demonstrabuntur etiam ad corpora gravia, quae nihil aliud sunt nisi objecta, quibus potentiae deorsum tendentes sunt applicatae, referri queant, et quaevis potentiae cum ponderibus possint comparari.

17. **Scholion 2.** Monendum etiam est, in sequentibus omnia corpora tanquam gravitatis expertia considerari, quae nullâ applicatâ potentîa nullibi se mouere conarentur; ideoque vim gravitatis in potentiis habeo, qua superveniente corpora demum conantur deorsum descendere.

18. **Divisio generalis.** Dividitur Statica optime quoad diversitatem objectorum, quibus potentiae applicatae intelliguntur. Quare in *prima* sectione de potentiis punto applicatis disseretur, quae tractatio instar fundamenti est sequentium. In *secunda* de aequilibrio potentiarum objectis rigidis applicatarum. In *tertia* de potentiis, flexibilibus objectis applicatis. In *quarta* objecta considerabuntur, ex pluribus partibus certo modo junctis composita. Tandem in *quinta* de potentiis plurimis corporibus a se invicem liberis et dissolutis agere constitui, ubi agetur de Hydrostatica.

Sectio prima.

De aequilibrio potentiarum punto applicatarum.

Annotatio manu Cel. Auctoris margini adscripta: Dividenda est haec Sectio in duas partes, quarum prima considerat punctum liberum, quod aequi libere in omnes partes moveri potest, altera vero punctum non liberum, quod ob obstacula in unam vel plures plagas moveri nequit. Id quod evenit, si firmo obstaculo inclinet ut lineae vel rectae vel curvae.

19. **Axioma 1.** Fig. 3. Si punto A duae potentiae aequales et quarum directiones directe sunt oppositae AB , AC , applicatae fuerint, punctum A in neutram plagam verget, et proin habebitur aequilibrium.

20. **Scholion.** Veritas hujus axiomatis constat ex principio sufficientis rationis; nulla es enim ratio, quare potius in hanc vel illam plagam tenderet. Sin autem altera altera major fuerit tum amplius aequilibrium existere nequit, quia non deest ratio, quare in unam plagam potius quam in aliam tendat.

21. **Coroll.** Quando ergo duabus potentias directe contrarie puncto applicatis, id in aequilibrio consistit, concludendum est; eas potentias esse inter se aequales.

22. **Problema 3.** Datae potentiae puncto applicatae aequale invenire pondus.

Solutio. Fig. 4. Sit puncto A applicata potentia in directione AB ; producatur BA ultra A , in eaque alicubi firmetur clavus C ; filum puncto A alligatum super C traducatur, eique dein alia atque alia pondera appendantur, donec aequilibrium obtineatur. Erit tum pondus P aequale potentiae, punctum A secundum AB trahenti. Trahitur enim A versus AC vi, quae aequalis est ponderi P (14). Et quia est aequilibrium, haec vis ipsi AB aequatur (21). Q. E. F.

23. **Coroll.** Hoc ergo modo omnes potentiae ad pondera reduci possunt, cum inveniri possint pondera cuilibet datae potentiae aequivalentia.

24. **Definitio 6.** *Potentia a aequalis* dicitur duabus aliis, b et c , simul sumtis, si hisce b et c , puncto A (Fig. 5) secundum directiones AB , AC , inter se parallelas et coincidentes applicatis, illa a , directe contrarie applicata juxta AD cum hisce in aequilibrio consistit.

25. **Coroll.** Hinc innoscet, quid sit potentia dupla, tripla etc. nempe si sit $c = b$, erit $a = 2b$; si $c = 2b$, erit $a = 3b$ etc.

26. **Hypothesis.** Potentiae in posterum designabuntur per lineas rectas in earum directione sumtas rationemque ipsarum potentiarum servantes, ut potentia dupla per lineam duplam, tripla per triplam exponetur; et generaliter, si dico (Fig. 6) puncto A duas potentias AB et AC esse applicatas, inde intelligi debet trahere eas secundum directiones AB et AC , et esse inter se ut lineas AB et AC .

27. **Scholion.** Possunt etiam potentiae hoc modo concipi, quemadmodum eas considerabo in demonstratione sequentis theorematis. Si (Fig. 7) puncto A applicata fuerit potentia AB , concipio ei normaliter junctam esse CD , quae cum basi EF cohaeret pluribus filis CE , DF contractibilibus; unde fiet, ut haec fila contrahere se quaerentia lineam CD ad EF trahere conentur, et hoc ipso punctum A in linea AB promovere contendant. Cum dein supponam, singula fila aequali vi sese contrahendi valere, potentiae diversae erunt inter se ut numeri filorum; ita ut potentiam duplam duplus filorum numerus exhibeat, triplam triplus, etc.

28. **Axioma 2.** Omnis potentia tantum agit quantum potest.

29. **Theorema 2.** Fig. 8. Si puncto A tres potentiae AB , AC , AD fuerint applicatae, obtinueritque aequilibrium, erit quaevis potentia AC ut sinus anguli BAD a reliquis comprehensi.

Demonstratio. Considerentur potentiae, ut § 27 monitum est, erunt potentiae AB , AC , AD inter se ut numeri filorum (Fig. 9) BE , CF , DG . Cum omnis potentia tantum agat, quantum potest (28), omnia haec fila se tantum contrahent, quantum possunt, antequam acquiescant, aequilibriumque efficiant. Quare in statu aequilibrii omnium filorum summa erit contractio, seu summa longitudinum omnium filorum erit minima. Unde status aequilibrii per methodum maximorum et minimorum determinari poterit. Ea sic se habet, ut totius status situs proximus concipiatur, quo ea quantitas, quae maxima vel minima esse debet, invariata deprehendetur. Transferatur igitur A in a , ita ut sit $AB = aB$, et hoc modo longitudi filorum BE non immutatur. Ducantur Ca et Da et perpendicularia Ag et ah . Patet fila CF elongata esse elementum ag , verum fila DG decurtata elementum Ah . Sit

numerus filorum $CF = m$, filorum $DG = n$. Omnia ergo filorum longitudine crevit elemento $m \cdot ag$ et decrevit elemento $n \cdot Ah$. Quare ex proprietate minimi, cum in utroque situ A et a eadem esse debeat filorum longitudine, erit $m \cdot ag = n \cdot Ah$; unde $m:n = Ah:ag$. Est autem $Ah:ag = \sin Aah:\sin aAg$; sed $\sin Aah = \sin BaD$ seu $\sin BAD$, quia $Aah + BaD$ aequatur duobus rectis, ob Dag et BaA rectos. Simili modo est $\sin aAg = \sin BAC$. Ergo $m:n = \sin BAD:\sin BAC$. Est vero $m:n = AC:AD$ (27); ergo $AC:AD = \sin BAD:\sin BAC$. Simili ratiocinio evincitur esse $AB:AC = \sin CAD:\sin BAD$, ut ergo quaevis potentia sit ut sinus anguli a reliquis duabus potentias formati. Q. E. D.

30. Coroll. 1. Ergo substituendo loco potentiarum pondera P , Q et R (Fig. 10) requiritur ad aequilibrium obtinendum, ut sit

$$P:Q = \sin DAC:\sin BAD$$

$$\text{et } P:R = \sin CAD:\sin BAC.$$

31. Coroll. 2. Habito ergo aequilibrio, cognoscetur inde ratio potentiarum seu ponderum ex sinibus angularium.

32. Problema 4. Fig. 11. Puncto A duabus potentias AB , AC applicatis, applicare tertiam AD , cum illis in aequilibrio consistentem.

Solutio. Ex potentias datis AB , AC compleatur parallelogrammum $ABEC$, in quo per A ducatur diagonalis AE , in qua ultra A prolongata accipiatur $AD = AE$; dico haec AD exhibere tertiam potentiam quaesitam. Est enim $AD (= AE):AB = \sin ABE:\sin AEB$. Sed ob figuram $ABEC$ parallelogrammum, est $\sin ABE = \sin BAC$ et $\sin AEB = \sin EAC = \sin CAD$. Consequenter erit $AD:AB = \sin BAC:\sin CAD$, ergo hae tres potentiae in aequilibrio consistunt (29). Q. E. I.

33. Coroll. 1. Si ducatur in parallelogrammo $ABEC$ altera diagonalis BC , haec et altera AE se mutuo bisecabunt in F . Quamobrem AD est dupla ipsius AF ; unde haec fluit problematis constructio: Fig. 12. Datae duae potentiae AB , AC jungantur recta BC ; haec bisecetur in F , ducaturque AF , et in hac ultra A producta sumatur $AD = 2AF$. Exprimet AD tertiam potentiam, cum datis AB et AC in aequilibrio constantem.

34. Coroll. 2. Si ergo Fig. 13 tres potentiae AB , AC , AD , puncto A applicatae, aequilibrium composuerint, junganturque BC , BD , CD , singula haec latera bifariam secabuntur in F , G et H a productis directionibus potentiarum DA , CA et BA .

35. Theorema 3. Fig. 14. Si fuerint puncto A quocunque potentiae AB , AC , AD , AE , AF , AG in aequilibrio constantes applicatae, et earum quaevis AB in alteram partem in P producatur, ut sit $AP = AB$, exprimet haec AP potentiam reliquis AC , AD , AE , AF , AG aequivalentem, aequali nimis cum illis in punctum A effectum exerentem.

Demonstratio. Cum omnes potentiae aequilibrium servent, potentiae AC , AE , AF , AG impediunt ne potentia AB effectum suum obtineat; oportet ergo, ut eae omnes simul conentur punctum A , secundum plagam ipsi A oppositam, i. e. secundum AP , et vi ipsi AB aequali promovere (5). Sed idem praestat potentia AP , quae una cum AB puncto A applicata, etiam aequilibrium constituit (19). Quare potentia AP aequivallet omnibus, praeter AB nempe, AC , AD , AE , AF , AG simul agentibus. Q. E. D.

36. **Coroll. 1.** Potentiis ergo quocunque puncto applicatis, ut definiatur potentia iis aequivalens, oportet determinari potentiam cum iis in aequilibrio constantem, huicque aequalem et contrariam applicari: erit haec potentia iis aequivalens.

37. **Coroll. 2.** Patet etiam, data potentia quocunque datis aequivalente, inde inveniri facilime potentiam, insuper ad aequilibrium obtainendum applicandam, illi nimur omnibus aequivalenti aequalem et oppositam applicando.

38. **Coroll. 3.** Fig. 15. Si ergo puncto A applicatae sint duae potentiae AC , AD , compleaturque parallelogrammum $ACPD$, diagonalis AP reprezentabit potentiam ambabus AC et AD aequivalentem; ejus enim aequalis et contraria AB cum illis in aequilibrio consistet (32).

Auct. script. in margine. Hic principium compositionis et resolutionis potentiarum inseratur.

39. **Coroll. 4.** Poterit ex § 33 eadem potentia aequivalens sine completione parallelogrammi inveniri, jungendo CD et ad ejus medietatem E ducendo AE : hujus duplum AB exhibebit potentiam aequivalentem (§ cit.).

40. **Definitio 7.** *Media directio* quocunque potentiarum vocatur directio potentiae, iis potentiiis omnibus aequivalentis.

41. **Coroll.** Duabus ergo potentiiis AC et AD puncto A applicatis, media earum directio incidit in diagonalem AP parallelogrammi $ACPD$ (38).

42. **Axioma 3.** Loco quocunque potentiarum puncto applicatarum, earum potentia aequivalens substitui potest.

43. **Problema 5.** Fig. 16. Puncto A quocunque potentiiis AC , AD , AE , AF applicatis, invenire potentiam iis omnibus aequivalentem.

Solutio. Duarum potentiarum AC et AD quaeratur aequivalens AG , jungendo puncta C et D recta CD , et per ejus medium L ducendo $AG = 2AL$ (38). Substituatur loco AC et AD haec AG (42), et eodem modo quaeratur potentia AH aequivalens potentiiis AG et AE (38), aequalebit haec tribus potentiiis AC , AD et AE ; quarum loco hac AH substituta (42), porro quaeratur potentia AP , potentiiis AH et AF aequivalens (38), aequalebit haec AP potentiiis AC , AD , AE et AF . Q. E. I.

44. **Coroll.** Potentiis ergo quocunque AC , AD , AE et AF puncto A applicatis, invenietur potentia AB insuper applicanda, ut aequilibrium obtineatur, accipiendo AB aequalem et oppositam potentiae AP , datis aequivalenti (39).

45. **Theorema 4.** Fig. 17. Puncto A tribus potentiiis AC , AD et AE applicatis, si ducatur CD , eaque in L bisariam secetur, dein jungatur LE , in eaque accipiatur $LM = \frac{1}{3}LE$, ducaturque AM , hujus triplum AP exprimet potentiam datis AC , AD et AE aequivalentem.

Demonstratio. Producatur AL in G , ut sit $AG = 2AL$, erit potentia AG aequivalens potentiiis AC et AD ; ducatur GE : demonstrari oportet primo rectam AM productam in medio H secari, et dein esse AM tertiam partem duplae AH , seu esse $AM:MH = 2:1$ (38).

Ex Geometria constat esse $\sin GAH : \sin EAH = GH : EH$. $AG : EH$ ex consideratione trianguli AGE ; sed ex triangulo ALE erit $\sin GAH : \sin EAH = LM : EM$. $AE : EM$. AL , unde haec eruitur analogia:

$$GH \cdot AE : EH \cdot AG = LM \cdot AE : EM \cdot AL$$

ergo ob $AL : AG = 1 : 2$ et $LM : ME = 1 : 2$, habebitur

$$GH : EH = LM : \frac{1}{2}EM = LM : LM, \text{ ergo } GH = EH, \text{ Q. E. Primum.}$$

Dein in triangulo AEG est $\sin AEL : \sin GEL = GE : AE$, ob $AL = LG$. Et in triangulo AEH est $\sin AEL : \sin GEL = AM \cdot EH : MH \cdot AE$; ergo erit $GE : AE = AM \cdot EH : MH \cdot AE$. Ergo ob $GE : HE = 2 : 1$ erit $2 : 1 = AM : MH$. Q. E. Alterum. Consequenter

$$AM : AH = 2 : 3 \text{ et } AM : AP = 1 : 3. \text{ Q. E. D.}$$

46. Theorema 5. Fig. 18. Si puncto A sint plures potentiae applicatae (quae in figura non sunt expressae) quarum numerus sit $n+1$; potentiarum autem n sit aequipollens AL , n vicibus sumta; si ducatur ex L ad residuam potentiam AE recta LE , eaque dividatur in M , ut sit $LM : EM = 1 : n$, erit AM pars $\frac{1}{n+1}$ potentiae, omnibus $n+1$ aequivalentis.

Demonstratio. Producatur AL in G , ut sit $AL : AG = 1 : n$, erit AG potentia aequivalens omnibus praeter AE ; jungatur GE : patet, ut AM sit media directio potentiarum AG et AE , opertere eam per medium H lineae GE transire (41), et ut sit $\frac{1}{n+1}$ potentiae aequivalentis omnibus $AM : 2AH = 1 : n+1$ (38). In triangulo ALE est

$$\sin GAH : \sin EAH = LM \cdot AE : EM \cdot AL = AE : nAL.$$

Dein in triangulo EAG est $\sin GAH : \sin EAH = GH \cdot AE : EH \cdot AG$. Ergo

$$AE : n \cdot AL = GH \cdot AE : EH \cdot AG;$$

ob $AG = n \cdot AL$ erit $1 : 1 = GH : EH$, ergo $GH = EH$. Dein in triangulo AEG est

$$\sin AEL : \sin GEL = AL \cdot GE : GL \cdot AE = GE : (n-1)AE;$$

at in triangulo AEH est $\sin AEL : \sin GEL = AM \cdot EH : HM \cdot AE$. Ergo ex his duabus oritur hae proportio $GE : (n-1)AE = AM \cdot EH : HM \cdot AE$; ob $GE = 2EH$ erit $2 : n-1 = AM : HM$. Ergo componendo $AM : AH = 2 : n+1$, unde $AM : 2AH = 1 : n+1$, sed $2AH$ seu AP exprimit potentiam omnibus aequivalentem (39). Q. E. D.

47. Coroll. Si ergo fuerit AL pars tertia potentiae aequivalentis tribus potentias, erit AL pars quarta potentiae aequivalentis quatuor. Si fuerit AL pars quarta potentiae aequivalentis quatuor potentiarum, erit AM pars quinta potentiae aequivalentis quinque, et ita porro.

48. Problema 6. Fig. 19. Puncto A quotcunque potentiarum AB, AC, AD, AE , etc. applicatis, invenire potentiam AP iis aequivalentem, alio breviori modo.

Solutio. Juncta BC , bisecetur in H , ductaque HD secetur in J , ut sit $HJ = \frac{1}{2}HD$, erit A pars tertia potentiae aequivalentis tribus AB, AC et AD (45). Ducta JE secetur in K , ut sit $JK = \frac{1}{4}JE$, erit AK pars quarta potentiae aequivalentis quatuor AB, AC, AD et AE (47). Jungatur KF , eaque secetur in L , ut sit $KL = \frac{1}{5}KF$, erit AL pars quinta potentiae aequivalentis illius quatuor cum AF (47). Sumta $LM = \frac{1}{6}LG$, erit assumpta $AP = 6AM$, AP aequivalens datis (47) etc. Q. E. I.

49. **Definitio 8.** *Centrum plurium potentiarum puncto applicatarum voco punctum, cuius a puncto, cui potentiae applicantur, distantia, per numerum potentiarum multiplicata, exprimit potentiam omnibus potentias applicatis aequivalentem.*

50. **Coroll. 1.** Punctum ergo M , ex praecedente problemate determinatum, est centrum potentiarum sex: AB, AC, AD, AE, AF et AG ; et quomodo pro quoque potentia determinetur, ex eodem problemate constat.

51. **Coroll. 2.** Patet etiam ex problemate (48), punctum M , nonnisi ex extremitatibus B, C, D, E, F, G linearum, potentias exprimentium, determinari, quae si sint eadem, centrum potentiarum idem erit, ubicunque situm sit punctum, cui potentiae applicantur.

52. **Scholion.** De hoc centro in sequentibus demonstrabitur, esse id centrum gravitatis punctorum potentias determinantium, nempe esse M centrum gravitatis punctorum B, C, D, E, F et G .

53. **Lemma 1.** Fig. 20. Si sint duo puncta C et D , ex hisque ad lineam quamcunque AB demittantur perpendicularia CA, DB , linea autem CD ita secetur in F , ut sit $CF:DF = 1:n$, et ex F in AB perpendicularum FE demittatur, erit

$$(n+1)FE = n \cdot AC + BD.$$

Demonstratio. Ducatur CG parallela ipsi AB , erit $DG: FH = CD: CF = n+1:1$, ergo

$FH = \frac{DG}{n+1}$. Sed $DG = BD - AC$, ergo $FH = \frac{BD - AC}{n+1}$. Ergo

$$AC + FH = EF = \frac{BD + n \cdot AC}{n+1}, \text{ consequenter } (n+1)EF = n \cdot AC + BD, \text{ Q. E. D.}$$

54. **Theorema 6.** Fig. 21. Sint B, C, D, E extremites rectarum, potentias puncto cui-dam applicatas exprimentium, M centrum potentiarum. Assumta quacunque recta be , ad eamque ex punctis B, C, D, E , item ex centro M demittantur perpendicularia Bb, Cc, Dd, Ee et Mm , erit Mm , in numerum punctorum B, C , etc. ducta, aequalis summae perpendicularium Bb, Cc, Dd, Ee .

Demonstratio. Juncta BC bifariam secetur in F , ductaque perpendicularo Ff erit

$$2Ff = Bb + Cc \quad (53).$$

Juncta FD secetur in G , ut sit $FG: DG = 1:2$; demisso ex G perpendicularo Gg , erit

$$3Gg = 2Ff + Dd = Bb + Cc + Dd.$$

Porro juncta GE , eaque secta in M , ut sit $GM: EM = 1:3$, erit M centrum potentiarum in punctis B, C, D et E desinentium (48, 50); demittatur ex M perpendicularum Mm , erit

$$4Mm = 3Gg + Ee \quad (53) = Bb + Cc + Dd + Ee.$$

Simili modo de quoque potentiarum numero demonstratur Mm , in numerum potentiarum ductam, aequari summae omnium Bb, Cc, Dd etc. Q. E. D.

Nota in marg. Idem ex resolutione potentiarum potest demonstrari.

55. **Coroll.** Me non monente patet, si quae puncta ultra lineam be cadant, perpendiculara ex iis demissa in be negativa accipi debere.

56. **Problema 7.** Fig. 22. Quotemque potentiarum BA, CA, DA, EA , etc. puncto A applicatarum invenire centrum M . et ita hinc curvam invenire quae distantiam centro potentiarum a recta GH dividat per numerum potentiarum.

Solutio. Ducta quacunque recta GH , ex punctis B, C, D et E extremis potentiarum datarum in eam rectam demittantur perpendicularia Bb, Cc, Dd, Ee , quorum summa aequalis erit distantiae centri potentiarum M a recta GH , ductae in numerum potentiarum (54). Erit ergo distantia centri potentiarum a recta GH aequalis summae omnium perpendicularium Bb, Cc etc. divisae per numerum potentiarum. Accipiatur in HJ , normali in GH , distantia haec centri sic inventa $H\mu$. Dein demittantur ex punctis B, C, D, E in rectam HJ perpendicularia, erunt haec bH, cH, dH, eH . Quorum summa divisa per numerum potentiarum exhibebit distantiam centri quae sit a recta HJ ; sit ea Hm . Compleatur rectangulum $HmM\mu$. Cum puncti M distantia a HG sit $Mm = H\mu$, et a HJ , sit $M\mu = Hm$, erit M centrum potentiarum quae situm. Q. E. I.

57. **Coroll. 1.** Ducta ergo AM , eaque pro numero potentiarum replicata, habebitur potentia omnibus aequivalens.

58. **Coroll. 2.** Fig. 23. Si numerus punctorum B, C, D , etc. sit infinitus, constituantque curvam continuam BE , simili modo invenietur centrum potentiarum. Quaeratur summa omnium distantiarum punctorum M, m a recta GH , eaque dividatur per numerum punctorum, qui exprimetur curva BME , et obtinebitur distantia centri potentiarum a GH . Eodem modo quaeratur summa distantiarum singulorum curvarum punctorum a recta HJ , qua divisa per curvam BME , obtinetur distantia ejusdem centri a recta HJ et hoc modo determinabitur. Accipiatur elementum curvae quodvis Mn , quod dicatur ds ; demittantur perpendicularia MP, mp , sit $PM = y$, exprimet yds summae distantiarum punctorum in Mn contentorum a GH ; ergo $\int yds$ exhibebit summam omnium punctorum in BE distantiarum a GH . Ergo $\int yds$ BME aequatur distantiae centri potentiarum a GH . Eodem modo demissis ex M et m in HJ perpendicularibus MQ, mq dictoque $MQ = x$, erit distantia centri $HJ = \int xds$ BME . Unde dabitur invenire auctum ab aliis distantiarum summis invenientur.

59. **Exemplum.** Sit Fig. 24 curva parabola AMC parametri a ; sit $AP = x$, $PM = y$, AB axis curvae, erit $yy = ax$, ergo

$$Mm = ds = \frac{dy}{a} \sqrt{(aa + 4yy)}, \text{ unde } yds = \frac{ydy}{a} \sqrt{(aa + 4yy)};$$

$$\text{ergo } \int yds = \frac{1}{12a} (aa + 4yy)^{\frac{3}{2}} - \frac{aa}{12} = \frac{2}{3a} \left(\frac{aa}{4} + yy \right)^{\frac{3}{2}} - \frac{aa}{12}.$$

Sit E focus, erit $AE = \frac{1}{4}a$, $PE = x - \frac{1}{4}a$, ergo

$$EM = \frac{1}{a} \left(\frac{aa}{4} + yy \right) \text{ et } \frac{aa}{4} + yy = a \cdot EM, \text{ consequenter } \int yds = \frac{2}{3} EM \sqrt{a \cdot EM} - \frac{aa}{12}.$$

Ducta tangente MT et demisso ex foco E perpendiculari EN , erit $EN = \frac{1}{2} \sqrt{a \cdot EM}$, unde

$$\int yds = \frac{4EM \cdot EN}{3} - \frac{4AE^2}{3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{(EN^2 - AE^2)}{AE}.$$

Ergo distantia centri potentiarum arcus AM ab axe AB est $= \frac{4(EN^2 - AE^2)}{3AE \cdot AM}$. Dein $xds = \frac{ydy}{a} \sqrt{(aa + 4yy)}$.

cujus summa a rectificatione parabolae dependet; vocetur summa ejus. Si verit distantia centri potentiarum a recta $AJ = \frac{s}{AM}$.

60. **Coroll. 3.** Fig. 25. Si curva CBD habuerit duos ramos BC, BD similes et aequales. Ducatur ex eis diameter BA , ad eamque normalis EF . Patet centrum potentiarum in CBD terminatarum in ipsam diametrum AB incidere. Ad hoc centrum ergo determinandum, non nisi distantiam ejus a recta EF investigari oportet, modo § 58 tradito. Distantiae inde inventae accipiatur AG aequalis, erit G centrum quaesitum.

61. **Exemplum.** Fig. 26. Sit CBD arcus circuli, cuius centrum A ; bisecto arcu CBD radio AB , ducatur ad eum normalis AP . Sit $AB = a$, $PM = y$, $AP = x$, erit $y = V(aa - xx)$ et $Mm = \frac{adx}{\sqrt{(aa - xx)}}$; unde $\int y ds = \int adx = ax$. Adeoque summa distantiarum omnium punctorum in arcu CBD erit $AB \cdot CD$. Ergo distantia centri potentiarum G ab A erit $= \frac{CD}{AB} = AG$.

62. **Theorema 7.** Fig. 27. Si punctum A attrahatur ad puncta B, C, D et E viribus, quae sunt ut distantiae a punctis iisdem, trahetur illud semper ad punctum fixum M , centrum potentiarum in punctis B, C, D, E terminatrum, vi, quae est ut distantia ipsius A ab M .

Demonstratio. Ductis rectis AB, AC, AD, AE , exponent hae rectae, quae sunt distantiae puncti A ab B, C, D et E , potentias, quibus A respective ad haec puncta trahitur (per hypoth.); habemus ergo casum potentiarum hucusque tractatarum (26). Quare A trahetur semper versus punctum fixum M (51) centrum potentiarum, et vi, quae est ut distantia AM , ducta in punctorum numerum (57) i. e. numero punctorum dato atque manente, ut distantia AM . Q. E. D.

63. **Coroll.** Si ergo punctum A ad quotcunque puncta B, C, D et E attrahatur in ratione distantiarum, idem est ac si illud ad unicum punctum M traheretur in eadem ratione distantiarum.

64. **Scholion.** Hucusque potentiae expressae sunt per lineas in directionibus earum assumtas, ut inde deduceretur lex, qua punctum ad quotlibet alia data, ad quae urgetur vi, quae semper est ut distantia ab iisdem, trahitur. At si ad ea puncta attrahatur vi, quae sit ut functio quaevis distantiae ab iisdem punctis, ad inventionem legis, qua ad omnia simul urgetur, potentias per functiones linearum exprimere oportet; quo circa sequentia ad hoc obtainendum adjungo.

65. **Theorema 8.** Fig. 28. Si punctum A urgeatur utcunque ad puncta B et C viribus, quae sint ut P et Q , ducaturque linea AD secans angulum BAC ita, ut sit $\sin BAD : \sin CAD = Q : P$, exprimet AD medium directionem.

Demonstratio. Producantur lineae AB et AC in b et c , ut sit $Ab : Ac = P : Q$; expriment iescentur ratio, ut $bD : cD = P : Q$, ergo $bD \cdot Q = cD \cdot P$, consequenter $bD = cD$.

Quare erit AD media directio (33). Q. E. D.

66. **Theorema 9.** Fig. 29. Urgeatur punctum A ad B et C potentias P et Q , ducaturque media directio AD . Erit $BD : CD = Q : AB : P : AC$.

Demonstratio. Cum AD sit media directio, erit $\sin BAD : \sin CAD = Q:P$ (65); sed est $\sin BAD : \sin CAD = BD \cdot AC : CD \cdot AB$, ergo

$$Q:P = BD \cdot AC : CD \cdot AB, \text{ consequenter } BD:CD = Q \cdot AB:P \cdot AC. \quad \text{Q. E. D.}$$

67. **Coroll.** Si fuerit $P = b \cdot AB^n$ et $Q = c \cdot AC^n$, erit $BD:CD = c \cdot AC^{n-1} : b \cdot AB^{n-1}$. Si ergo puncta B et C in ratione reciproca duplicata distantiarum attrahant, erit $n = -2$, unde

$$BD:CD = c \cdot AB^3 : b \cdot AC^3.$$

68. **Theorema 10.** Fig. 28. Puncto A sollicitato ad B et C potentias P et Q , erit potentia aequipollens ad alteram datarum P ut se habet sinus anguli BAC ad sinum CAD , existente AD media directione.

Demonstratio. Productis AB et AC in b et c , ut sit $Ab:Ac = P:Q$, bisecta bc , exprimet AD dimidium potentiae aequivalentis (33). Est autem

$\sin BAC : \sin CAD = bc \cdot AD : cD \cdot Ab$; sed $bc = 2cD$, ergo $\sin BAC : \sin CAD = 2AD : Ab =$ potentia aequivalens: P ; ergo potentia aequivalens est ad P ut $\sin BAC$ ad $\sin CAD$. Q. E. D.

69. **Coroll. 1.** Fig. 29. Juncta recta BC , quam media directio in D secet, erit

$$\sin BAC : \sin CAD = BC \cdot AD : CD \cdot AB;$$

consequenter potentia aequivalens erit ad alterutram datarum, puta ad eam, quae secundum AB agit, P , ut $BC \cdot AD : CD \cdot AB$.

70. **Coroll. 2.** Est autem $BD:CD = Q \cdot AB:P \cdot AC$ (66), ergo $BC:CD = Q \cdot AB + P \cdot AC:P \cdot AC$. consequenter, potentia aequivalente dicta E , erit $E \cdot AC \cdot AB = P \cdot AC \cdot AD + Q \cdot AB \cdot AD$.

71. **Problema 8.** Fig. 30. Si punctum A ad puncta quotunque B, C, D, E , etc. attrahatur in ratione cuiusvis functionis distantiarum AB, AC, AD, AE , etc., invenire medium directionem harum potentiarum et potentiam aequivalentem.

Solutio. Producantur, si opus est, directiones AB, AC, AD, AE , etc. et accipientur Ab, Ac, Ad, Ae , etc., quae se habeant ut eae functiones, adeoque exprimant potentias, quibus punctum A secundum respectivas directiones sollicitatur. Quo facto media directio et potentia aequivalens ex §§ 56 et 57 determinabitur, demittendo ad invicem normales FR et LR , ex punctis b, c, d, e , etc. perpendicula bF, cG, dH, eJ et bK, cL, dM, eN , etc.; dein accipiendo RP aequalem summae perpendiculorum in FR , divisae per numerum potentiarum, et denique ducendo perpendiculum PO , aequale summae perpendiculorum in RL , divisae per numerum potentiarum, erit O centrum potentiarum; unde reliqua facile determinantur. Q. E. I.

72. **Problema 9.** Fig. 31. Si punctum A ad singula puncta curvae BM trahatur in ratione cuiusvis functionis distantiarum, invenire medium directionem et potentiam aequivalentem.

Solutio. Assumatur quodvis curvae elementum Mm , et dimittantur in AB perpendicula MP , mp ; dicatur $AP = x$, $PM = y$, $Am = z = \sqrt{(xx+yy)}$. Sit functio, secundum quam A ad puncta elementi Mm attrahitur, Z ; producatur Am in N , ut sit $AN = Z$, demittanturque perpendicula NQ

et NT : erit vis, qua A ad N sollicitatur, ut Z in numerum punctorum Mm ; sit $Mm = ds$; erit haec vis $= Zds$. Fiat $z:y = Zds : \frac{Zyds}{x}$, quae exprimet potentiam secundum NQ agentem, et $\frac{Zxds}{z}$ potentiam secundum NT . Ergo summa omnium perpendicularium NQ est $\int \frac{Zyds}{z}$, quae divisa per numerum punctorum in curva BM (s) dat $\int \frac{Zyds}{z} : s$. Huic aequalis accipiatur AS . Dein summa omnium perpendicularium $NT = \int \frac{Zxds}{z}$, quae divisa per numerum potentiarum s , dabit distantiam centri potentiarum (56) a AT , nempe $SO = \int \frac{Zxds}{z} : s$; erit ergo O centrum potentiarum (56), unde quae sit facile determinantur. Q. E. I.

73. **Coroll. 1.** Fig. 32. Si curva BCD ita fuerit comparata, ut a recta AC in duas partes similes et aequales dividatur, insuper autem functio Z eadem maneat, manente z , palam est centrum potentiarum in ipsam AC incidere, ad quod investigandum saltem accipiatur $AO = \int \frac{Zxds}{z} : s$; erit O centrum potentiarum quae situm: idque, si tantum ramus CB consideretur, quia alter ipsi aequalis est et similis.

74. **Coroll. 2.** Patet dein vim omnibus aequivalentem esse $AO.s$ (57) seu manente s ; positione autem puncti A variata, erit vis aequivalens ut AO .

75. **Exemplum 1.** Sit curva attrahens (Fig. 33) linea recta BC perpendicularis in AB , et $AB = a$, erit $x = a$, $BM = s = y$; ergo $AM = z = \sqrt{(aa + ss)}$, unde

$$AS = \int \frac{Zsds}{\sqrt{(aa + ss)}} : s \text{ et } SO = \int \frac{Zads}{\sqrt{(aa + ss)}} : s.$$

Sit $Z = cz^n = c(aa + ss)^{\frac{n}{2}}$, erit

$$AS = \int csds (aa + ss)^{\frac{n-1}{2}} : s = \frac{c}{n+1} \cdot \frac{(aa + ss)^{\frac{n+1}{2}} - c}{s} + C.$$

Quia AS evanescit si $s = 0$, erit $C = -a^{n+1}$, ergo

$$AS = \frac{c(aa + ss)^{\frac{n+1}{2}} - ca^{n+1}}{(n+1)s} \text{ et } SO = \int acds (aa + ss)^{\frac{n-1}{2}} : s.$$

Quae expressio, quoties $\frac{n-1}{2}$ non est numerus integer affirmativus, non integrari potest. Si ergo Fig. 34. punctum A ad duas rectas BC , DE parallelas, aequidistantes ab A , aequales et in BD normales attrahatur, quia tum SO evanescit, erit

$$AO = \frac{c(aa + ss)^{\frac{n+1}{2}} - ca^{n+1}}{(n+1)s}.$$

76. **Exemplum 2.** Fig. 35. Attrahat recta BC , cum qua in directum jacet punctum A , erit $y = 0$, $BM = s$ (AB posito $= a$), $AM = x = a + s$, $z = a + s$, erit

$$AO = \int \frac{Zds(a + s)}{a + s} : s = \int \frac{Zds}{s}.$$

Sit $Z = (a + s)^n$, erit $AO = \frac{(a + s)^{n+1} - a^{n+1}}{(n+1)s}$. Designet s totam BC , ergo vis aequipollens

$\frac{(a+s)^{n+1} - a^{n+1}}{a^{n+1}}$, seu ut $(a+s)^{n+1} - a^{n+1}$. Si $n=1$, erit haec vis ut distantia puncti A a medietate lineae BC ; si $n=-2$, erit vis aequivalens in ratione reciprocâ duplicata mediae proportionalis inter AB et AC , seu erit reciproce ut rectangulum ex AB in AC . At si sit $n=-1$, erit

$$AO = \int \frac{ds}{a+s}; s = t \left(\frac{a+s}{a} \right); s = \frac{t(a+s) - ta}{a}. \\ \text{Ergo vis aequivalens est ut log. } AC \text{ demo log. } AB,$$

77. Exemplum 3. Fig. 36. Sit peripheria circuli BMD ; ex centro C erigatur perpendicularis CA super ejus planum, in quo situm sit punctum A , quod a peripheria attrahatur. Sit radius $BC=a$, $AC=b$, erit $AM=\sqrt{aa+bb}$; unde in nostro casu $x=b$, $y=a$, $z=\sqrt{aa+bb}$. Sit centrum potentiarum O , erit enim in recta AC ; erit

$$AO = \int \frac{Zxds}{z}; s = \int \frac{Zbds}{\sqrt{aa+bb}}; s = \frac{Zb}{\sqrt{aa+bb}} \text{ ob. } Z \text{ constantem.}$$

Sit $\sqrt{aa+bb}=c$ et $Z=c^n$, erit $AO=bc^{n-1}$. Ergo tota vis $= bc^{n-1}p$, existente p peripheria circuli. Sit T punctum, in quo, si tota peripheria, eadem manente lege attractionis, congregeretur, A eadem vi attraheretur; sit $AT=x$, erit vis $= x^n p = bc^{n-1}p$, unde $x=b^{\frac{n}{n-1}} c^{\frac{n}{n-1}} = AT$. Si $n=1$, incidet T semper in C , sin vero $n=-2$, erit $AT=c\sqrt{\frac{a}{b}}$.

78. Exemplum 4. Fig. 37. Attrahatur punctum A a toto circuli CBb area. Assumatur circulus quivis concentricus CMN radio $CM=y$, et ejus peripheria $\frac{py}{r}$, posita ratione radii ad peripheriam $r:p$; erit vis, qua punctum A a peripheria hac MN trahitur $= b(bb+yy)^{\frac{n-1}{2}} py:r$. Ergo vis, qua a limbo $MNmn$, posito $Mm=dy$, attrahitur, erit $b(bb+yy)^{\frac{n-1}{2}} pydy:r$, quae expressio integrata exhibet vim, qua punctum A a circulo CMN attrahitur, nempe

$$bp(bb+yy)^{\frac{n-1}{2}} : (n+1)r - b^{n+2}p : (n+1)r.$$

Sit $CB=a$, erit vis, qua a toto circulo CBb trahitur

$$bp(aa+bb)^{\frac{n+1}{2}} : (n+1)r - b^{n+2}p : (n+1)r.$$

Ad inveniendum punctum, in quo, si totus circulus congestetur, punctum A eodem modo urgeretur, ponatur hujus puncti T ab A distantia $AT=x$, erit vis attractiva inde ortâ $= x^n paa : 2r$, ergo

$$x = \sqrt[n]{\frac{2b}{(n+1)aa}} \left((aa+bb)^{\frac{n+1}{2}} + b^{n+1} \right) = \left(\frac{2b(aa+bb)^{\frac{n+1}{2}} - 2b^{n+2}}{(n+1)aa} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

79. Exemplum 5. Fig. 38. Attrahatur punctum A a superficie sphærica, genita revolutione semiperipheriae BMD circa diametrum BD . Dicatur $AC=b$, $BC=a$, et assumto puncto quovis M , ductaque applicata MP , sit $CP=x$, erit $AP=b-x$, $PM=\sqrt{aa-xx}$; erit vis, qua punctum A a peripheria a punto M genita trahitur, $AP \cdot AM^{n-1} \cdot p \cdot PM:r$. Est vero

$$AM=\sqrt{aa+bb-2bx}, \text{ unde haec vis } = (b-x)(aa+bb-2bx)^{\frac{n-1}{2}} p \sqrt{aa-xx}:r.$$

Assumto puncto proximo m , erit $Mm = \frac{adx}{\sqrt{(aa - xx)}}$, unde vis, qua A a limbo a Mm genito trahitur,

$$\text{ap} dx (b - x)(aa + bb - 2bx)^{\frac{n-1}{2}}; r^{\frac{n+3}{2}} \quad \text{dixit: } adx = dx, r = \sqrt{aa - xx}$$

Sit $b - x = z$, erit haec vis $= \text{ap} zdz (aa - bb + 2bz)^{\frac{n-1}{2}}; r^{\frac{n+3}{2}}$. Ergo vis a producto arcus BM genita

$$\frac{\text{ap}(aa - bb + 2bz)^{\frac{n+3}{2}}}{2rbb(n+3)} + \frac{\text{ap}(bb - aa)(aa - bb + 2bz)^{\frac{n+3}{2}}}{2rbb(n+1)} - \frac{\text{ap}(b-a)^n + 3}{2rbb(n+3)} + \frac{\text{ap}(b+a)(b-a)^{n+2}}{2rbb(n+1)}$$

Ergo vis a tota superficie sphaerica orta est

$$\frac{\text{ap}(a+b)^{n+3}}{2rbb(n+3)} - \frac{\text{ap}(b-a)^{n+3}}{2rbb(n+1)} + \frac{\text{ap}(b+a)(a+b)^{n+2}}{2rbb(n+1)} - \frac{\text{ap}(b-a)(b-a)^{n+2}}{2rbb(n+1)}$$

Si $n = 1$, abit haec expressio in $\frac{2aabp}{r}$; ut ergo attractiones sint ut distantiae a centro, et eodem modo se habeant ac si tota superficies ibi esset congesta. Si $n = -2$, erit vis attractiva $= \frac{2aap}{rbb}$, quae est reciproce ut quadratum distantiae a centro, et eodem fit modo ac si tota superficies in centro congregateur. Hoc modo res se habet, si A sit extra superficiem; sin vero intra in P , erit vis, qua a BM trahitur:

$$= \frac{\text{ap}(aa - bb)^{\frac{n+3}{2}}}{(n+3)(n+1)rbb} + \frac{\text{ap}(a-b)^{n+3}}{2rbb(n+3)} - \frac{\text{ap}(a+b)(a-b)^{n+2}}{2rbb(n+1)}$$

Et a genito ex DM ,

$$= \frac{\text{ap}(aa - bb)^{\frac{n+3}{2}}}{(n+3)(n+1)rbb} + \frac{\text{ap}(a-b)^{n+3}}{2rbb(n+3)} - \frac{\text{ap}(a-b)(a+b)^{n+2}}{2rbb(n+1)}$$

Trahetur ergo ad C vi

$$= \frac{\text{ap}(a+b)^{n+3} - \text{ap}(a-b)^{n+3}}{2rbb(n+3)} + \frac{\text{ap}(a+b)(a-b)^{n+2} - \text{ap}(a-b)(a+b)^{n+2}}{2rbb(n+1)}$$

Sit $n = 1$, erit vis rursus $= \frac{2aabp}{r}$; si $n = -2$, erit haec vis $= 0$. Nempe intra superficiem versus omnes plagas aequaliter trahitur. Id notandum, quod si n sit numerus impar, expressionem attractionis extra et intra esse eandem; at si sit n numerus par, tum eam esse diversam.

ad. 804. Exemplum 6. Attraheatur a punctum A a tota sphaera genita convolutione semicirculi BMD , circad axem BD , scilicet vis, qua ad quamvis particulam attrahitur, sit ut potentia n distantiae. Manentibus quicquidem denominationibus ac in § praeced., erit vis, qua A ad circumflexum revolutionem MP genium attrahitur, scilicet (SC. p. 51) $\text{ap} \frac{p}{r} (aa - bb + 2bz)^{\frac{n+1}{2}} - z^{n+1}$

$$= \frac{\text{ap} (p)}{(n+1)r} ((AM^{\frac{n+1}{2}} - AP^{\frac{n+1}{2}}) = \frac{pz}{(n+1)r} ((aa - bb + 2bz)^{\frac{n+1}{2}} - z^{n+1})$$

ergo vis, qua a genito elementi $PpmM$ trahitur, est omni inveniendis etiamque elementis, quae inveniuntur in quicunque a rectiore parte additi sunt, uno multo minus inveniendis, quae inveniuntur in quicunque a rectiore parte minus additi sunt, et inveniendis, quae inveniuntur in quicunque a rectiore parte additi sunt, minus $\frac{pz}{(n+1)r} ((aa - bb + 2bz)^{\frac{n+1}{2}} - z^{n+1})$, scilicet inveniendis cuius integralis est

$$\frac{p}{(n+1)(n+3)rbb} ((aa - bb + 2bz)^{\frac{n+3}{2}} - p(b-a)^{n+3} + p(bb - aa)(aa - bb + 2bz)^{\frac{n+3}{2}} - p(bb - aa)(b-a)^{n+2} + pz^{n+3} + p(b-a)^{n+2})$$

quod exprimit vim, qua A a frusto globi ab BPM genito trahitur. Vis autem, qua a toto globo trahitur, est

$$= \frac{p(b+a)^{n+5} - p(b-a)^{n+5}}{2(n+1)(n+5)rbb} - \frac{p(bb+aa)(b+a)^{n+3} + p(bb+aa)(b-a)^{n+3}}{2(n+1)(n+3)rbb} =$$

$$\frac{p(nab+3ab-aa-bb)(b+g)^{n+3} + p(nab+3ab+aa-bb)(b-a)^{n+3}}{(n+1)(n+3)(n+5)rbb}$$

Si $n=1$, erit attractio $= \frac{2pba^3}{3r}$; attrahetur ergo A in ratione distantiae a centro; et eodem modo ac si totus globus in centro esset collectus. Si $n=-2$, erit attractio $= \frac{2pa^3}{3rbb}$, eodemque modo se habet ac si totus globus in centro esset coadunatus. Si punctum A sit intra globum in P , erit vis, qua a solido a segmento BPM genito trahitur,

$$= \frac{p(aa-bb)^{\frac{n+5}{2}} + p(a-b)^{n+5}}{2(n+1)(n+5)rbb} - \frac{p(bb+aa)(a-b)^{n+3} - p(aa-bb)^{\frac{n+5}{2}}}{2(n+1)(n+3)rbb};$$

reliqua vero globi pars attrahit vi, quae est

$$= \frac{p(aa-bb)^{\frac{n+5}{2}} + p(a+b)^{n+5}}{2(n+1)(n+5)rbb} - \frac{p(bb+aa)(a+b)^{n+3} - p(aa-bb)^{\frac{n+5}{2}}}{2(n+1)(n+3)rbb}$$

trahitur ergo ad centrum globi vi

$$= \frac{-p(a-b)^{n+5} + p(a+b)^{n+5}}{2(n+1)(n+5)rbb} - \frac{p(bb+aa)(a+b)^{n+3} + p(bb+aa)(a-b)^{n+3}}{2(n+1)(n+3)rbb} = \\ \frac{p(-aa-bb+nab+3ab)(a+b)^{n+3} + p(nab+3ab+aa-bb)(a-b)^{n+3}}{(n+1)(n+3)(n+5)rbb}$$

Ubi notandum, si n sit numerus impar, hanc formulam a superiore non differre; at si sit n numerus par, valde fore diversam, ut si sit $n=-2$, erit vis $= \frac{2pb}{3r}$. Ergo intra globum trahitur in ratione distantiae a centro.

81. Scholion. Cum iis in casibus, ubi n est numerus par, formula vim attractricem exprimens, duplex haberi debeat, prout punctum A sit extra vel intra figuram attrahentem. Videtur hic lex continuitatis non servari, cum tractio modo hanc, modo illam legem sequatur. Ad hoc dubium tollendum, dico vim attractivam talem algebraice non posse exprimi. Haec enim vis expressio: si n est par, non congruit cum hypothesi attractionis: Sit enim (Fig. 39) punctum attrahens A attractum A , $AC=x$, et vis, qua A ad C trahitur x^n , quae exhibet vim, qua A deorsum tendit. Transferatur A in a , ut sit $Ca=-x$; erit denuo vis, qua deorsum tendit, $=(-x)^n =$ (ob numerum parem) x^n ; oportet ergo a denuo deorsum ad D tendere; at ex hypoth. debet versus trahi, unde haec expressio . . . et correctione opus habet. Sin autem n numerus impar, erit attractio deorsum versus $D = -(x)^n$ i.e. sursum tum trahetur, ob signum $-$, secundum legem attractionis.

82. Axioma. Fig. 40. Si punctum C adjaceat firmo obstaculo AB , eique applicata sit potentia trahens CD , normalis in AB , punctum C nihilominus quiescat. Obstaculum autem AB premet

potentia, quae aequalis est potentiae CD . Si vero puncto C plures potentiae applicatae fuerint, id quiesceret, si media directio in obstaculum fuerit normalis.

83. **Coroll. I.** Fig. 41. Si ergo grave seu pondus C incumbat firmo obstaculo AB , quiesceret illud, at subjectum obstaculum AB premet potentia aequali ejus ponderi (6).

84. **Coroll. 2.** Fig. 42. Si autem puncto C duae potentiae CD et CE oppositae fuerint applicatae, quarum utraque in AB normalis, patet si CD fuerit major CE , punctum C in quiete permanere, et obstaculum AB premere excessu potentiae CD super CE , at si $CE = CD$, ob statum aequilibrii (19), C quiescere et prorsus non obstaculum AB premere. Sin vero CE major fuerit quam CD , tum C amplius quiescere non posse, sed eodem modo in recta CE procedere, ac si differentia potentiarum $CE - CD$ illuc traheretur.

85. **Coroll. 3.** Fig. 43. Si ergo puncto C potentia CD , perpendicularis in tangentem ab obstaculi curvilinei ACB applicata sit, me non monente patet, eodem modo C in quiete permansurum, ac si ab designaret obstaculum, quoniam ab et ACB in puncto contactus C coincidunt.

86. **Scholion.** Veritas axiomatis inde patet, quod ob firmitatem obstaculi C (Fig. 40) directionem CD sequi non possit, et nulla adsit ratio, quare potius versus A quam B moveretur.

87. **Problema 10.** Fig. 44. Puncto O obstaculo AB adjacente, eique potentia OC applicata, invenire potentiam ei insuper applicandam, ut O in quiete permaneat.

Solutio. Potentia OC resolvatur in potentias laterales OD , OE , complendo parallelogrammum rectangulum $CDOE$, quarum OE est normalis in AB , altera vero OD agit secundum directionem obstaculi AB . Aequivalet potentia OC duabus OE et OD simul agentibus (38). Potentia autem OE puncto O nullum motum valet imprimere (82); adeoque non opus est hanc potentiam, applicatione contrariae, destruere. Altera vero OD punctum O libere valet secundum OD promovere, quia obstaculum ejus actionem non impedit; haec ergo applicatione contrariae, eique aequalis OF destruatur. Punctum O , applicata ei insuper potentia OF , in quiete persistet; obstaculum vero AB premetur potentia OE . Persistet autem O etiam in quiete, si potentia OE vel prorsus vel ex parte destruatur (84), applicata ergo $OJ = OE$. Duæ potentiae OF et OJ simul, seu quae iis aequivalet OH (38) servabit O in quiete, et in hoc casu est $OH = OC$, eique directe contraria. Deinde si saltem OG , quae minor est quam OJ , applicetur, conservabit OK , aequivalens ipsis OG et OF , denuo quietem. Quocirca ducta FH parallela et aequali ipsi OE , omnes rectae OK , quae ex O ad FH duci possunt, exhibebunt potentias una cum OC , in quiete punctum O conservantes. Poterit porro OE , quantum libet, augeri, et nihilominus quietis status conservabitur. Applicetur ergo, praeter OF destruentem OD , potentia OL : haec duæ OF et OL simul, seu iis aequivalens OM denuo O in quiete servat. Ergo si producetur CO in H , ut sit $OH = CO$, atque ex H demittatur infinita recta HR perpendicularis in AB , quaecunque recta ex O ad eam ducta OK , OM punctum O in quiete conservabit. Q. E. I.
Script. ad marg. Melius haec solutio adornatur, praemittendo constructionem.

88. **Coroll. I.** Problema ergo hoc infinitas admittit solutiones, cum infinite possint applicari potentiae, cum data OC statum quietis servantes.

89. Coroll. 2. Ex solutione manifestum est, conferendo cum ea § 84, quanta vi obstaculum AB , in quo vis casu prématur, nempe applicata potentia OK vel OM , obstaculum premetur vi, quae exponitur recta HK vel HM . Cum in priori casu sit $HK=OE-OG$, in posteriori $HM=OE+OL$.

90. Coroll. 3. Fig. 45. Si ergo fuerit obstaculum AB ad horizontem inclinatum, eique incumbat punctum grave O , seu cui applicata est potentia verticalis OC : patet quomodo id in statu quietis servari debet. Erecta nempe verticali $OH=OC$, ducatur infinita HR , directionem AB obstaculi in F normaliter secans. Quaelibet recta OK , OM , ex O ad hanc HR ducta, exhibet potentiam, cum OC statum quietis servantem. Et loco harum potentiarum poterunt pondera adhiberi (12).

91. Scholion. Facile patet, quare perpendicularum HF in plagam R in infinitum liceat producere non item ultra H . Cum enim pressio, quam sustinet obstaculum AB , sit proportionalis ipsius KH electa potentia OK . Si ergo applicetur potentia OH , pressio haec evanescet. Sin autem potentia ultra OH accipiatur, vis obstaculum premens erit negativa. Ergo (84) punctum O directe ab obstaculo removeretur.

92. Theorema 11. Fig. 46. Puncto O obstaculo AB adjacente, applicatis potentias CO , OD , id in quiete conservantibus, erunt potentiae OC et OD inter se reciproce ut cosinus angulorum AOC , BOD , quos cum AB constituunt.

Demonstratio. Cum OC et OD quietem conservent, patet ex solutione problematis praecedentis, demissis in AB perpendicularis CE , DF , fore $OE=OF$. Est autem $\cos AOC = \frac{OE}{OC}$ et $\cos BOD = \frac{OF}{OD}$, unde erit $\cos AOC : \cos BOD = OE : OD : OF : OC = OD : OC$. Ergo $OC : OD = \cos BOD : \cos AOC$. Q. E. D.

93. Coroll. 1. Obstaculum autem AB premitur potentia, quae est $= CE - DF$; exprimit autem CE tangentem anguli AOC et DF tangentem anguli BOD , ob radios OE , OF aequales. Premitur ergo obstaculum AB potentia, quae est ut tang AOC — tang BOD . Cavendum igitur, ne haec expressio negativa evadat, quo in casu O ex statu quietis exturbabitur (91).

94. Coroll. 2. Fig. 47. Si fuerit planum AB , cum horizonte AE angulum BAE constituens, eique incumbat grave O , seu cui applicata est potentia verticalis OC , trahaturque O quoque a pondera P secundum OD . Ad id, ut O in quiete servetur, requiritur ut sit pondus P ad pondus puncti O , seu ad vim, qua deorsum niti supponitur, ut $\cos AOC : \cos BOD = \sin BAE : \cos BOD$ id est, ut sinus anguli inclinationis plani, ad cosinum anguli, quem directio OD cum piano AB conficit.

95. Coroll. 3. Fig. 48. Si ergo angulus DOB evanescit, recta DO incidente in AB , erit cosinus hujus anguli $=$ sinu toto. Erit ergo P ad pondus ipsius O ut sinus ang. BAE ad sinum totum, i. e. ut BE ad AB .

96. Theorema 12. Fig. 49. Si fuerint duo pondera O et o , planis inclinatis AB et ab incumbentia, cum horizontalibus AE , $aे$ angulos BAE , bae constituentibus, sintque ea pondera O et o juncta filo ODO , supra clavum firmum D protenso, aequilibrium habebitur, si ex utraque parte factum ex pondera in sinum anguli inclinationis applicatum ad cosinum anguli, quem filum cum directione plani constituit, fuerit idem.

Demonstratio. Ut pondus O in quiete conservetur, oportet, ut filum OD trahatur seu tendatur potentia, quae est $\frac{O \sin BAE}{\cos DOB}$ (94). Hac ergo vi conabitur O filum OD promovere. Eodem modo pondus o tendet filum Do vi $= \frac{o \sin bae}{\cos Dob}$ (cit.), quae duae expressiones, ut aequilibrium obtineatur, debent esse aequales. Etenim in statu aequilibrii necesse est, ut filum ex utraque parte aequaliter trahatur. Consequenter in statu aequilibrii oportet, ut sit $\frac{O \sin BAE}{\cos DOB} = \frac{o \sin bae}{\cos Dob}$. Q. E. D.

97. Coroll. 1. Fig. 50. Incumbat pondus O curvae AOB , cuius tangens OT , sitque id alligatum filo in D firmato, ducaturque verticalis DP , in hancque perpendiculum OP . Erit vis filum OD tendens $= \frac{O \sin TOP}{\cos DOT}$. Est autem $\sin TOP = \frac{PT}{OT}$, et demissio ex T in OD perpendiculo TQ , $\cos TQO = \frac{OQ}{OT}$, ergo $\frac{O \sin TOP}{\cos TQO} = \frac{O \cdot PT}{OQ}$. Ad has determinandas vocetur

$$DP = x, PO = y, DO = \sqrt{(xx + yy)} = z, PT = t;$$

erit ob triangula DQT , DPO similia, $DQ = \frac{xx - tx}{z}$, unde $OQ = \frac{xx - xx + tx}{z} = \frac{yy + tx}{z}$, hincque vis filum OD tendens $= \frac{O \cdot tz}{yy + tx}$.

98. Coroll. 2. Quia t est subtangens, erit ex natura tangentium $t = \frac{ydx}{dy}$, unde

$$\frac{O \cdot tz}{yy + tx} = \frac{O \cdot zydx}{yydy - yxdx} = \frac{O \cdot zdx}{ydy + xdx}.$$

Est autem $ydy + xdx = zdz$; unde vis filum OD tendens erit $= \frac{O \cdot dz}{dz}$

99. Problema 11. Fig. 51. Junctis ponderibus O et o filo ODO super clavo D mobili, et eorum alterutro ubicunque super curva AB data posito. Determinare alteram curvam ba , super qua, si alterum o incumbat, semper habeatur aequilibrium.

Solutio. Ducta verticali DP , in eamque demissis perpendiculis ex O et o , OP et op , dicatur filii longitudo $OD + Do = a$, $DP = x$, $DO = z$, erit $Do = a - z$, sitque $Dp = v$. Erit vis, qua filum DO a pondere O trahitur $= \frac{O \cdot dx}{dz}$ (98); et eodem modo tendetur filum Do a pondere o vi

$\frac{o \cdot dv}{dz}$. Hae duae vires tendentes filum ODO , ut aequilibrium obtineatur, debent esse aequales; est ergo $\frac{Odx}{dz} = \frac{odv}{dz}$, hincque $Odx = -odv$; consequenter integrando erit $Ox = ob - ov$, ubi pro

b quaecunque data accipi potest. Est ergo $x = \frac{o(b - v)}{o}$. Dein dictis $PO = y$ et $po = t$, erit

$$a = \sqrt{(xx + yy)} + \sqrt{(vv + tt)} = \frac{\sqrt{(oo(b - v)^2 + OOyy)}}{o} + \sqrt{(vv + tt)}$$

ergo $oo(b - v)^2 + OOyy = aaOO + OOVv + Oott - 200a\sqrt{(vv + tt)}$, consequenter

$$y = \sqrt{(aa - vv - tt - 2a\sqrt{(vv + tt)} - \frac{oo(b - v)^2}{oo})}.$$

Huius valores ipsorum x et y , si in aequatione inter x et y pro curva data BOA substituantur, orientur aequatio inter v et t pro curva quae sita boa . Q. E. I.

100. Coroll. Est ergo, sumto $DO + Do = a$, $DP \cdot O + Dp \cdot o$ quoque constans. Si ergo fuerit $O = o$, erit summa abscissarum $DP + Dp$ constans, sumta $DO + Do$ constante. Patet ergo quomodo data una, altera facile construi possit.

101. Exemplum 1. Fig. 52. Sit curva data recta DO , per D transiens, et $y = nx$; erit ad alteram curvam:

$$\sqrt{(aa + vv + tt - 2a\sqrt{vv+tt} - \frac{oo(b-v^2)}{oo})} = \frac{no(b-v)}{o}.$$

Ergo $\frac{(nn+1)oo}{oo}(b-v)^2 = (a - \sqrt{vv+tt})^2$, unde $\frac{o(b-v)}{o}\sqrt{nn+1} = a - \sqrt{vv+tt}$.

Sit $\sqrt{nn+1} = m$, erit $oa - mob + mov = o\sqrt{vv+tt}$, quae est aequatio ad hyperbolam vel ellipsin, prout mo majus vel minus est quam O ; sin autem $mo = O$, erit curva quaesita parabola. Si $oa = mob$, erit $ot = v\sqrt{mnoo - oo}$, etiam pro recta per D transeunte.

102. Exemplum 2. Fig. 53. Sit curva data circuli quadrans DOA per D transiens. Erit dicto radio $DC = c$, $yy = 2cx - xx$. Substitutis loco y et x valoribus inventis (99), erit

$$(a - \sqrt{tt+vv})^2 = \frac{oo(b-v)^2}{oo} + \frac{2oc(b-v)}{o} - \frac{oo(b-v)^2}{oo} = \frac{2oc(b-v)}{o}$$

consequenter

$$aa + tt + vv - \frac{2oc(b-v)}{o} = 2a\sqrt{tt+vv}.$$

Quae aequatio exhibet curvam quarti ordinis. Si $aa = \frac{2obc}{o}$, erit

$$tt + vv + \frac{aa}{b} = 2a\sqrt{tt+vv}.$$

103. Scholion. Obiter hic moneo inservire hanc curvam pontibus elevandis. Si enim OC designet pontem, circa C mobilem: dum is elevatur, punctum extremum O movetur in quadrante AOD . Si ergo altera curva Doa dicto modo construatur et pondus debitum o funi, circa trochleam in D circumPLICATO, appendatur, in quounque situ pontis, pondus o eum in aequilibrio conservabit, ut ergo minima vis, hoc aequilibrium tollens, pontem attollere et rursus demittere possit. Ratio hujus autem in sequentibus, ubi de natura vectis disseretur, quaeri debet.

104. Problema 12. Fig. 54. Si pondera O et o fuerint aequalia, determinare casus, quibus curvae BA et Ba sunt inter se eadem et similiter applicatae.

Solutio. In statu quoconque ODo demissis perpendicularis OP , op , erit $DP + Dp$ constans; accepta ergo $DC = \frac{DP + Dp}{2}$, erit C punctum fixum, ergo semper $CP = Cp$. Dicatur $CP = x$, erit $Cp = -x$, sit $DC = b$, erit $DP = b + x$ et $Dp = b - x$. Exprimatur DO per functionem ipsius P , quae, si loco x substituatur $-x$, abeat in p . Designabit ergo p rectam Do ; oportet igitur, ut sit $P + p$ constans (100); ponatur $P + p = 2a$. Erit ergo $P = a + Q$ et $p = a - Q$; ut autem P abeat in p , si loco x substituatur $-x$, patet Q talem esse debere ipsius x functionem, quae abeat in $-Q$, posito $-x$ loco x . Unde loco Q subrogari possunt x , x^3 , x^5 etc. $x^{\frac{n}{m}}$, si n numerus impar et m par, etiam $x\sqrt{cc+xx}$ et hujusmodi infinitae, quae facile determinantur. Est ergo $DO = a + Q$; sit $PO = y$, erit

$$yy + bb + 2bx + xx = aa + 2aQ + QQ. \quad \text{Q. E. I.}$$

105. Exemplum. Sit $Q = hx$, erit $yy + xx(1 - hh) + 2x(b - ah) + bb - aa = 0$, quae
equatio, si $1 > h$, est ad ellipsin, si autem $1 < h$, ad hyperbolam; si vero $1 = h$, ad parabolam.
Invenimus $yy = 2x(a - b) + aa - bb$; erit ergo $BC = \frac{a+b}{2}$ et $DB = \frac{b-a}{2}$. Sit

$$BP = t = x + \frac{a+b}{2}, \text{ ergo } x = t - \frac{a+b}{2}, \text{ consequenter } yy = 2t(a-b);$$

est ergo curva parabola, cuius parameter $= 2a - 2b$. Facta ergo Fig. 55 parabola OBo , cuius axis verticalis BC , constitui debet punctum fixum D in foco. Punctum C autem ubi lubet accipi potest. Et dein longitudi filii erit $= 2BC + 2BD$, atque hoc modo parabola satisfacit. Sin autem fuerit $\frac{b+ah}{b-h} = \sqrt{\frac{bb+aa}{hh-1}}$, erit $a = hb$ et $\frac{by}{\sqrt{(aa-bb)}} = b+x$, seu $by = (b+x)\sqrt{(aa-bb)}$ pro linea recta per D transeunte.

106. Theorema 13. Fig. 56. Si duo pondera O et o , filo rigido Oo alligata, incubant respective planis inclinatiis AB et Ab , erunt ea in aequilibrio, si fuerit O ad o ut (ducta horizontali Bb) factum ex BA in $\cos AOO$ ad factum ex Ab in $\cos AoO$.

Demonstratio. Accepto in Oo puncto quocunque D , patet ad aequilibrium obtainendum, punctum tanta vi versus o trahi debere, quanta versus O trahitur. Etenim ut O in statu suo conservetur, oportet ut filum OD ad D certa vi trahatur. Sed o , quia descendere conatur, filum oD certa vi trahit; haec ergo vires ad aequilibrium obtainendum aequales esse debent. Vis autem, qua OD versus D trahi debet, est $= \frac{o \cdot \sin Abb}{\cos AOO}$; vis vero, qua o filum Do tendit, est $= \frac{o \sin AbB}{\cos AoO}$. Oportet ergo ut sit $\frac{o \sin Abb}{\cos AOO} = \frac{o \sin AbB}{\cos AoO}$; sed $\sin Abb : \sin AbB = Ab : AB$, ergo

$$O : o = AB \cos AOO : Ab \cos AoO. \quad Q. E. D.$$

107. Coroll. 1. Ex demonstratione patet esse etiam $O : o = \frac{\cos AOO}{\sin Abb} : \frac{\cos AoO}{\sin AbB}$.

Script. ad marg. Corollarium hoc in theorema, theorema vero in corollarium mutetur.

108. Coroll. 2. Fig. 57. Si lineae AB , Ab fuerint parallelae, obtinebitur ob $\sin Abb = \sin AbB$ et $\cos AOO = -\cos AoO$, haec analogia $O : o = -1 : 1$ i. e. $O = -o$, seu alterutrum corpus sursum tendere debet, ut figura annexa monstrat.

109. Coroll. 3. Fig. 58. Si altera linea Ab fuerit horizontalis, erit $AB : Ab = 0 : 1$, hincque $O : o = 0 \cdot \cos AOO : \cos AoO$. Quia autem $O : o$ datur, oportet ut sit $\cos AoO = 0$ seu ang. AoO rectus.

110. Coroll. 4. Fig. 59. Si altera linea AB fuerit verticalis, erit $O : o = \frac{\cos AOO}{1} : \frac{\cos AoO}{\sin Abb}$, ergo $\cos AOO : \cos AoO = O \cdot Ab : o \cdot AB$. Constructio hujus ex sequenti generali patebit.

111. Coroll. 5. Fig. 60. Sint latera AB , Ab uteunque posita, et Bb sit horizontalis; oportet sit $O : o = AB \cos AOO : Ab \cos AoO$, erit $\cos AOO : \cos AoO = O \cdot Ab : o \cdot AB$. Ad Oo erigatur normalis OE , ipsi ba productae in E occurrens. Erit

$$\sin EOA = \cos AOO \text{ et } \sin AEO = \cos AoO;$$

sed $\sin EOA : \sin AEO = AE : AO$. Ergo haec habetur analogia $AE : AO = O \cdot Ab : o \cdot AB$. Datur igitur ratio ipsius AE ad AO , unde haec oritur constructio. Cum detur ratio ponderum, producatur

(Fig. 61) bA in F , ut sit $AF:AB = O:Ab \cdot o:AB$, seu accipiatur $AF = \frac{o \cdot Ab}{o}$ i.e. $o:O = Ab:AB$. Jungatur BF et in eam ex A demittatur perpendicularis AD , aequalis longitudini filii datae. Exducatur parallela ipsi Ab , alteram AB in O secans, et ex O parallela ipsi AD applicetur Oa , exhibebit haec Oo positionem filii ad aequilibrium requisitum.

112. Problema 13. Fig. 62. Data una curva AO , invenire alteram Ao ejus conditionis, uponera O et o , filo Oo alligata, quomodocunque applicata, sint in aequilibrio.

Solutio. Sit situs filii Oo ; utriusque curvae axis verticalis AC ; ducantur applicatae OP , op nec non tangentes OT , ot , plana, quibus pondera incumbunt, exhibentia. Sit $Oo = a$ et $AP = y$; in altera curva $Ap = v$, $pa = z$. Erit primo $Oo^2 = Pp^2 + (PO - po)^2$ i.e. $aa = (y + z)^2 + (x - v)^2$. Dein ex § 107 est $O:o = \frac{\cos TOC}{\sin TOP} : \frac{\cos toc}{\sin top}$. Demisso ex T in Oo productam perpendiculo TQ , erit $\cos TOC = \frac{oQ}{OT}$ et $\sin TOP = \frac{TP}{OT}$, ergo $\frac{\cos TOC}{\sin TOP} = \frac{oQ}{PT}$. OQ autem sic invenitur: Ob triangula similia OCP et TCQ fac $OC:CP = TC:CQ$; ad obtinendum OC fiat $y + z:a = y:\frac{ay}{y+z} = OC$; ad CP fiat $y + z:x - v = y:\frac{y(x-v)}{y+z} = CP$, et $TC = TP - CP = \frac{ydx}{dy} - \frac{y(x-v)}{y+z}$; est ergo.

$$CQ = \frac{ydx(x-v)}{ady} - \frac{y(x-v)^2}{a(y+z)}; \text{ ergo } OQ = \frac{ydx(x-v)}{ady} - \frac{y(x-v)^2}{a(y+z)} + \frac{aay}{a(y+z)}.$$

Sed est $aa - (x - v)^2 = (y + z)^2$, ergo $OQ = \frac{ydx(x-v)}{ady} + \frac{y(y+z)}{a}$. Cum autem sit $PT = \frac{ydx}{dy}$, erit

$$\frac{OQ}{PT} = \frac{x-v}{a} + \frac{dy(y+z)}{adx} = \frac{ydy + zdy - xdx - vdx}{adx} = \frac{\cos TOC}{\sin TOP}.$$

Eodem modo est

$$\frac{\cos toc}{\sin top} = \frac{zdz + ydz + vdv - xdx}{adv}.$$

Quia autem est $aa - (x - v)^2 = (y + z)^2 + (x - v)^2$, erit

$$0 = ydy + zdz + zdy + zdz + xdx - xdv - vdx + vdv,$$

ergo $zdz + ydz + vdv - xdx = -ydy - zdy - xdx + vdx$,

consequenter

$$\frac{\cos toc}{\sin top} = \frac{-ydy - zdy - xdx + vdx}{adv}.$$

Erit igitur $O:o = \frac{1}{adx} : \frac{-1}{adv} = -dv:dx$, adeoque $Odx = -odv$ et integrando $Ox + ov = \text{Const.}$

Quia autem est $aa = (y + z)^2 + (x - v)^2$, erit

$$x = \frac{c - ov}{o} \text{ et } y = \sqrt{(aa - (x - v)^2) - z} = -z + \sqrt{\left(aa - \left(\frac{c - ov}{o}\right)^2\right)}.$$

Unde data aequatione inter x et y , invenietur aequatio inter v et z . Q. E. I.

113. Coroll. 1. Sit $C = (O + o)b$, erit $x = \frac{(O + o)b - ov}{o}$ et $y = -z + \frac{\sqrt{(Ooaa - (O + o)^2(b - v)^2)}}{o}$.

114. Coroll. 2. Si fuerit $O = o$, erit $x = 2b - v$ et $y = -z + \sqrt{(aa - 4(b - v)^2)}$.

115. Coroll. 3. Fig. 63. Data una curva, hoc modo facile altera construir. Sit una AO et accepto quovis punto O , demittatur applicata OP . In axe accipiatur Ap , ut sit $\frac{AP \cdot O + Ap \cdot o}{O + o} = b$.

ex p. erigatur perpendicularum po. Centro O radio = a describatur circulus secans po in o, erit o punctum in curva quaesita. a est longitudine filii, sed b linea ad arbitrium sumta.

116. Exemplum 1. Si altera linea fuerit recta, erit altera sectio conica, ut calculum tenuanti facile patebit.

117. Exemplum 2. Sint pondera O et o aequalia et una curva circulus, cujus diameter = a, ut adeo sit $yy = ax - xx$; sit porro $2b = a$, erit $x = a - v$ et

$$y = -z + \sqrt{(aa - (a - 2v)^2)} = -z + \sqrt{(4av - 4vv)}$$

at $ax - xx = av - vv$, unde $-z + 2\sqrt{(av - vv)} = \sqrt{(av - vv)}$, ergo $z = \sqrt{(av - vv)}$, seu $zz = av - vv$; aliter ergo curva est rursus semicirculus. Consequenter in circulo, si linea pondera jungens fuerit diametro aequalis, quomodounque ea applicetur, aequilibrium habebitur. Sed linea non solum non extensibilis, sed etiam neque contractibilis, neque flexibilis esse debet.

118. Problema 14. Determinare casus, ubi hae duae curvae sunt eadem, positis ponderibus aequalibus.

Solutio. Fig. 64. Sint duae curvae quaesitae AO , Ao , quae debeant esse eadem. Accipiantur duo loca O et o , in quibus pondera existunt, homologa. Erit ductis applicatis OP , op , $AP + Ap$ constans = $2b$, accipiat ergo $AE = b$, erit semper $PE = pE$; erit autem $po = p\omega$. Dicatur $PE = x$, erit $pE = -x$, sitque $PO = y$, unde si haberetur aequatio inter x et y , inveniri posset $p\omega$ ponendo, loco ω , $-x$. Interim autem dicatur $p\omega = z$, quae ex eo definiri debet, quod puncta O et ω sint in eadem curva. Est vero $aa = (y + z)^2 + 4xx$, ergo $y + z = \sqrt{(aa - 4xx)}$; siat $y = P + \frac{1}{2}\sqrt{(aa - 4xx)}$, abeat autem P in Q , si loco ω ponetur $-x$, unde erit

$$z = Q + \frac{1}{2}\sqrt{(aa - 4xx)}.$$

Oportet ergo sit $P + Q = 0$. Unde patet loco P poni posse x , x^3 , x^5 , etc., seu loco P substitui potest quaevis functio impar ipsius x ; functio enim impar abit in sui negativam, posito $-x$ loco x , ergo earum summa sit nihilo aequalis. Designante igitur P functione impari, erit

$$y = P + \frac{1}{2}\sqrt{(aa - 4xx)}, \text{ hincque } 4yy - 8Py + 4PP = aa - 4xx;$$

adoque est

$$yy + xx = \frac{1}{4}aa + 2Py - PP,$$

quae aequatio exhibet generalissime curvas quaesitas. Q. E. I.

119. Exemplum 1. Fig. 65. Sit $P = nx$, erit $yy + xx(1 + nn) = \frac{1}{4}aa + 2nxy$, quae est aequatio generalis pro omnibus ellipsis. Videamus ergo, quomodo quaevis ellipsis applicari ad hunc usum possit. Sit ellipsis AMB , cuius axis transversus c ; erit conjugatus $= \frac{aa}{c}$. Erit autem $n = \frac{cc - aa}{ac}$; ex B constituatur perpendicularis BD in axem $AB = \frac{cc}{2a}$, et ex centro C ducatur CD , ut sit $CB:BD = a:c$. Erit haec CD verticalis quaesita, cuius pars D infra tendere debet, ut figura praesens exhibet (Fig. 66): habet nimurum formam cordis inversi. Si fuerit $a = c$, abit ellipsis in circulum, et etiam figura cordiformis fit circularis, juxta § 117.

120. Exemplum 2. Quia $nx\sqrt{(aa - 4xx)}$ est quoque functio impar ipsius x , substituatur loco P , et habebitur $y = (nx + \frac{1}{2})\sqrt{(aa - 4xx)}$, erit ergo

$yy = (nx + \frac{1}{2})^2 (aa - 4ax) = nnaaxx - 4nnx^4 + naax - 4nx^3 + \frac{1}{4}aa - xx$,
 aequatio ad curvam quarti ordinis. Et quoniam y habet duas dimensiones, erit curva ex utraque
 axis plaga eadem; quapropter curva satisfaciens erit una continua curva, non ex duabus curvis com-
 posita. (Fig. 67).

121. Theorema 14. Fig. 68. Si fuerit puncto O , intra angulum AOB sito, potentia quae-
 cunque OC applicata, producta CO , erit potentia, qua AO premitur, ad potentiam, qua BO premitur
 ut $\cos BOF$ ad $\cos AOF$.

Demonstratio. Vis OC resolvatur in duas laterales OD et OE , quae sint perpendicularares in
 AO et OB . Cum vis OC aequivaleat duabus OD et OE simul agentibus (38), vis autem OD tota
 in pressionem lateris AO , et vis OE in pressionem lateris OB impendatur, erit vis, qua AO premitur,
 ad vim, qua BO premitur, ut OD ad OE , seu CD , i. e. ut $\sin DCO : \sin DOC$; sed $\sin DCO =$
 $\sin COE$, et ob angulos AOD , BOE rectos, est $\sin COE = \cos BOF$ et $\sin DOC = \cos AOF$. Ergo
 vis in AO est ad vim in BO , ut $\cos BOF$ ad $\cos AOF$. Q. E. D.

122. Coroll. 1. Fig. 69. Si ergo fuerint duo plana inclinata AO et BO in O concurrentia
 et in angulo pondus O incumbat, quia in hoc casu OF est verticalis, ducatur horizontalis MN , e-
 rit $\cos AOF = \sin AOM$ et $\cos BOF = \sin BON$. Quare vires, quibus plana haec premun-
 tur, sunt reciproce ut sinus angulorum inclinationis.

123. Coroll. 2. Fig. 68. Si OC in OD incidat, tota vis in pressionem lateris AO impen-
 ditur; si autem ultra OD cadit, tum punctum O non amplius in aequilibrio persistit, sed juxta OA
 movebitur; ut ergo O in quiete persistat, oportet ut OC intra OD et OE cadat.

Sectio secunda.

De aequilibrio potentiarum, virgae rigidae applicatarum.

124. Axioma 5. Fig. 70. Si figurae cujuscunque ACD punto A applicata fuerit potentia
 AB , eundem haec in figuram exercet effectum, ac si in puncto quolibet alio M , in AB producta
 assumto, applicata fuerit secundum eandem directionem agens.

125. Scholion. Veritas hujus axiomatis cuique facile innotescet, hoc modo rem consideranti
 ac si filum in M fixum secundum directionem MB traheretur; tum enim figurae usque in A exacte
 adjacebit. Ponatur filum in A usque agglutinari, effectus ejus non mutabitur; resecetur portio AM ,
 effectus manebit; quare sive filum in A sive in M figatur, effectus idem erit.

126. Coroll. Fig. 71. Si ergo figurae ACD duae potentiae AB , ab applicatae sint, produ-
 cantur directiones earum donec sese mutuo in M intersecent; utraque earum eundem praestabit ef-
 fectum, ac si in M essent applicatae. Reducitur igitur hoc modo casus duarum potentiarum, duobus
 diversis punctis figurae applicatarum, ad casum jam expositum praecedenti sectione duarum poten-
 tiarum eidem puncto applicatarum.

127. Scholion 1. Manifestum est, hic intelligi debere potentias, cum figura in eodem plano
 constitutas; alioquin sese mutuo nusquam intersecarent.

128. Scholion 2. Ex hoc principio omnes casus potentiarum virgac rigidae non in eodem puncto applicatarum resolvuntur. Cum enim punctum illud, quo sese mutuo intersecant duae potentiae, nonnisi imagini opituletur, cuicunque figurae poterit affingi tantum planum, quantum sufficit ad punctum intersectionis excipendum.

129. Divisio. Divido hanc Sectionem in duas partes, prout virga vel libera sit, ut omnibus potentias aequa facile cedere valeat, vel ab obstaculo uteunque impedita. Utramque partem iterum subdividere convenit pro figura virgac, utrum ea recta sit an curva. Quos casus omnes in hac sectione evolvam, aut ad minimum principia praebeo, quibus singuli casus resolvi poterunt.

130. Problema 15. Fig. 72. Si virgac rectae AB duae potentiae AC , BD applicatae fuerint, in eodem plano positae, oportet applicare potentiam OM duabus datis aequivalentem.

Solutio. Producantur CA et DB donec se mutuo in a intersecent. Considerari ergo potentiae AC et BD possunt quasi punto a applicatae (128); siat igitur $ac = AC$ et $ad = BD$, quae potentias datas tanquam in a applicatas exhibent. Ducatur cd , eaque bisecta in e , ducatur ae , cuius duplum am exhibet potentiam duabus ac , ad aequivalentem (38). Transferatur haec in ae producta in OM , quae adhuc aequipollit duabus ac et ad (128); aequivalet igitur quoque potentias AC et BD . Q. E. I.

131. Coroll. 1. Quia potentiae datae in eodem plano positae esse debent (127), patet, pro potentias non in eodem plano sitis aequivalentem inveniri non posse. Ponatur enim dari potentiam aequivalentem duabus non in eodem plano sitis, resolvatur utraque in duas, quarum una in eodem plano cum aequivalente, altera in id normalis. Patet has normales ab assumta aequivalente non compensari posse, quare aequivalens non datur.

132. Coroll 2. Poterit quoque punctum O ex hac proprietate inveniri: In $\triangle acd$, a recta ae secto, est $\sin cae : \sin dae = ce.ad : de.ac = ad : ac$ (ob $ce = de$) $= BD : AC$ (per hyp.) Dein in $\triangle AaB$ ab aO secto est $\sin cae : \sin dae = AO.aB : BO.aA$; unde conficitur $BD : AC = AO.aB : BO.aA$. Est vero $aB : aA = \sin BAA : \sin ABa = \sin CAB : \sin DBA$; ergo erit $BD : AC = AO \sin CAB : BO \sin DBA$; consequenter $AO : BO = BD \sin DBA : AC \sin CAB$; est ergo $AC.AO \sin CAO = BD.BO \sin DBO$: factum AC in AO et $\sin CAO$ vocatur momentum potentiae AC respectu puncti O . Ergo momenta vis et ultra O debent esse aequalia.

133. Coroll. 3. Fig. 73. Definito modo puncto O , in quo potentia aequivalens applicari debet, magnitudo ejus et positio sequenti modo facilius invenietur: Ex B ducatur Bc parallela et aequalis ipsi AC ; ducta cD et bisecta in e , ducatur Be , cuius duplum erit Bm ; huic ex O aequalis et parallela ducatur OM , erit haec potentia aequivalens quaesita.

Script. ad marg. ad Fig. 74. Momentum potentiae BA in O aequatur $BA.OE$, demisso OE perpendiculo in BA productam.

134. Coroll. 4. Fig. 75. Si potentiarum applicatarum directiones AC , BD fuerint inter se parallelae, erit $\sin CAB = \sin DBA$, adeoque erit $AO : BO = BD : AC$, seu est $AC.AO = BD.BO$. Dein, quia in hoc casu Bc (Fig. 73) incidit in BD , incidet quoque Bm in BD , eritque

$$Bm = AC + BD = OM.$$

Ducatur igitur (Fig. 75) OM parallela ipsius AC vel BD accipiaturque aequalis $AC + BD$, exprimet haec OM potentiam duabus datis aequivalentem.

Script. ad marg. Momentum potentiae aequatur momentis potentiarum aequivalentium.

135. Coroll. 5. Fig. 76. Inventa potentia aequivalente OM , obtinebitur potentia propositas AC et BD in aequilibrio servans. Producatur nimirum MO in alteram partem in N usque, ut si $ON = OM$; exprimet ON potentiam cum OM in aequilibrio stantem. Cum autem OM aequivaleat ambabus AC et BD , patet et ON in aequilibrio conservaturam potentias AC et BD .

Script. ad marg. Momentum potentiae AC in O aequatur vi, quam virga in O habere debet, ne frangatur.

136. Coroll. 6. Fig. 77. Si directiones potentiarum in eadem recta cum virga jaceant, ut AC et BD , erit tum $AO:BO = BD \sin DBA:AC \sin BAC$ id est ut $0:0$. Quare cum hic 0 ad rationem quamcunque habere queat, punctum O ubicunque accipi poterit, et potentia aequivalens etiam in ipsam AB incidet, et aequalis erit differentiae inter has potentias, inque plagam fortioris dirigetur.

137. Scholion. Veritas hujus corollarii immediate ex axiome quinto patet, juxta quod eodem redit, in quo virgae AB punto potentiae applicentur, quia directiones earum in eam incident. Idem ad plures potentias eodem modo extenditur.

138. Coroll. 7. Fig. 78. Methodus tradita, duarum potentiarum aequivalentem vel contraria inveniendi, facile ad plures potentias extendetur. Hoc modo sint virgae AB applicatae potentiae AC , JD , KE , LF , NG et BH ; sumantur primo duae AC , JD , harumque quaeratur aequivalens quae loco duarum AC , JD substituatur; hujus et alias v. gr. KE iterum quaeratur aequivalens, locum AC , JD , KE substituenda, et hoc peragatur, donec omnium aequivalens OM obtineatur.

139. Theorema 15. Fig. 79. Sint virgae rigidae AB duae potentiae AC , BD quaecunque applicatae, ductaque sit potentia OM iis aequivalens. Tum si in AB producta punctum quocunque Z accipiatur, erit $OM \cdot OZ \sin MOZ = AC \cdot AZ \sin CAZ + DB \cdot BZ \sin DBZ$.

Script. ad marg. NB. Propositio haec valet, si Z extra rectam AB sumatur: generalius ergo proponatur demonstratio.

Demonstratio. Patet per § 132 esse $AC \cdot AO \sin CAZ = BD \cdot BO \sin DBZ$; ergo ob $AO = AZ - OZ$ et $BO = OZ - BZ$, erit $AC \cdot AZ \sin CAZ - AC \cdot OZ \sin CAZ = BD \cdot OZ \sin DBZ - BD \cdot BZ \sin DBZ$, sive $AC \cdot AZ \sin CAZ + BD \cdot BZ \sin DBZ = AC \cdot OZ \sin CAZ + BD \cdot OZ \sin DBZ = OZ(AC \sin CAZ + BD \sin DBZ)$. Nunc circa positionem lineae OM consulatur § 133, juxta quem ducatur Bc aequalis et parallela ipsi AC et juncta cD , bifariamque secta in e , ducta est $Bm = 2Be$, quae aequalis est et parallela ipsi OM . Ducatur porro per e recta fg parallela virgae AB ; erit $2Be \sin Beg = Bf \sin Bfe + Bg \sin Bge$ seu $OM \sin MOZ = Bf \sin CAZ + Bg \sin DBZ$. Dein in $\triangle Deg$ est

$$\sin Deg : \sin Dge (= \sin DBZ) = Dg : De,$$

$$\text{et in } \triangle fec \text{ est } \sin cef : \sin cfe (= \sin CAZ) = cf : ce,$$

ergo ob $\sin Deg = \sin cef$ et $De = ce$ (hyp.), erit

$Dg \sin DBZ = cf \sin CAZ$, seu, $Dg \sin DBZ - cf \sin CAZ = 0$.

Est igitur $OM \sin MOZ = Bf \sin CAZ + Bg \sin Bge + Dg \sin DBZ - cf \sin CAZ = Bc \sin CAZ + BD \sin Bge = AC \sin CAZ + BD \sin DBZ$.

Consequenter substituto supra loco $AC \sin CAZ + BD \sin DBZ$ ejus aequali $OM \sin MOZ$ habebitur
 $AC \cdot AZ \sin CAZ + BD \cdot BZ \sin DBZ = OM \cdot OZ \sin MOZ$. Q. E. D.

140. **Coroll. 1.** Si Z incidat in O , erit $OZ = 0$, $AZ = AO$, $BZ = - BO$, ergo

$$AC \cdot AO \sin CAZ = BD \cdot BO \sin DBZ$$

nt jam constat.

141. **Coroll. 2.** Distet punctum Z infinite, erunt AZ , OZ , BZ inter se aequales, unde consequitur $AC \sin CAZ + BD \sin DBZ = OM \sin MOZ$, uti jam ex ipsa demonstratione elucet.

142. **Coroll. 3.** Fig. 80. Ex hisce, quae de duabus potentias demonstrata sunt, facile colligitur, quid de pluribus potentias AE , BF , CG , DH , virgae AD applicatis respectu puncti Z , in AD producta accepti, statuendum sit, designante OM potentia omnibus aequivalente. Exprimat ωm potentiam aequivalentem duabus AE et BF , et $\omega \mu$ potentiam aequivalentem duabus CG et DH ; erit OM potentia duabus ωm et $\omega \mu$ aequivalens; ergo $OM \cdot OZ \sin MOZ = \omega m \cdot oZ \sin moZ + \omega \mu \cdot \omega Z \sin \mu \omega Z$.

Est vero $\omega m \cdot oZ \sin moZ = AE \cdot AZ \sin EAZ + FB \cdot BZ \sin FBZ$ et

$\omega \mu \cdot \omega Z \sin \mu \omega Z = GC \cdot CZ \sin GCZ + HD \cdot DZ \sin HDZ$, ergo

$$OM \cdot OZ \sin MOZ = AE \cdot AZ \sin EAZ + FB \cdot BZ \sin FBZ + GC \cdot CZ \sin GCZ + HD \cdot DZ \sin HDZ$$

et haec proprietas valet, quantuscunque fuerit numerus potentiarum.

143. **Coroll. 4.** Si Z incidat in O , abibunt AZ , BZ , CZ , DZ

in AO , BO , $-CO$, $-DO$

et OZ exanescet. Ergo $AE \cdot AO \sin EAO + FB \cdot BO \sin FBO = GC \cdot CO \sin GCO + HD \cdot DO \sin HDO$.

Ubi notandum est, ex una parte omnes potentias ex una parte puncti O esse constitutas, et ex altera potentias ex altera parte puncti O applicatas.

144. **Coroll. 5.** Cum in hac aequalitate neque ipsa OM neque angulus MOA in computum ingrediatur, poterit ex ea locus puncti O inveniri.

145. **Coroll. 6.** Si punctum Z infinite distet, erunt AZ , BZ , CZ , DZ et OZ inter se aequales, et ideo erit $AE \sin EAZ + BF \sin FBZ + CG \sin GCZ + DH \sin HDZ = MO \sin MOZ$.

146. **Coroll. 7.** Ex hac aequalitate factum ipsius potentiae aequivalentis omnibus, MO , in sinum anguli, quem cum virga constituit, cognoscitur; si igitur alia insuper proprietas adjiciatur, potentia OM penitus applicari poterit.

147. **Problema 16.** Fig. 81. Si virgae rigidae AD potentiae quoctunque AE , BF , CG , DH inter se parallelae applicatae fuerint, invenire potentiam OM , omnibus aequivalentem.

Solutio. Patet ex § 134 potentiam duabus parallelis aequivalentem iisdem esse parallelam, quod quoque ad plures potentias extenditur. Ut ergo OM sit parallela directioni potentiarum, erunt anguli EAZ, FBZ, GCZ, HDZ et MOZ omnes inter se aequales, ergo ex § 145 facta divisione per angulorum sinus, elicetur $MO = AE + BF + CG + DH$. Dein, assumto Z ut ante, ex § 142 abjectis sinibus angulorum, nanciscimur

$$OM \cdot OZ = AE \cdot AZ + FB \cdot BZ + GC \cdot CZ + HD \cdot DZ$$

quia vero $MO = AE + BF + CG + DH$, erit

$$OZ = \frac{AE \cdot AZ + FB \cdot BZ + GC \cdot CZ + HD \cdot DZ}{AE + BF + CG + DH}.$$

Unde invenietur punctum O , ex quo dein ducatur OM , parallela potentis datis et omnibus sumtis aequalis: exprimet haec OM potentiam omnibus aequivalentem. Q. E. I. Ergo momentum potentiae aequivalentis in Z aequatur summae omnium momentorum in Z .

Script. ad marg. Problema generaliter concipiatur pro potentis utcunque inclinatis, et invenietur $ZO =$ summae omnium momentorum divisae per summam potentiarum, in sinus inclinationum suarum ductarum, et problema ipsum, instar corollarii, inde derivetur.

148. Coroll. 1. Si potentiae OM aequalis et directe contraria applicetur, erit ea in aequilibrio cum omnibus applicatis. Patet ergo hoc in casu potentiam, datas in aequilibrio servantem, eandem cum iis directionem habere et iis omnibus simul sumtis esse aequalem.

149. Coroll. 2. Fig. 82. Appendantur virgae rigidae AB pondera P, T, Q ex punctis A, C, B ; determinetur O ut doctum est, et, filo OM verticaliter posito et supra trochleas M et N ducto appendetur pondus R , aequale ipsis P, T et Q simul; conservabit hoc pondus R reliqua in aequilibrio, ut ex antecedentibus clarum est.

150. Scholion. Non immoror hic expositioni casum, quibus directiones potentiarum ad alteram virgae partem cadunt, quibus in casibus valor ipsarum evadit negativus, id quod cuivis in Geometria versato, qualem hic lectorem suppono, nullam difficultatem facesset. Ne propterea corollaria nimium accumulentur.

151. Definitio 9. Si loco potentiarum pondera applicentur, punctum, in quo potentia, omni applicata pondera in aequilibrio servans, applicari debet, vocatur *centrum gravitatis*.

Coroll. marg. adscript. Sequitur hinc centrum gravitatis non mutari, utcunque inclinations potentiarum varientur, modo inter se semper parallelae maneant.

152. Scholion. Evidem non opus est, ut pondera reipsa sint applicata. Sed cum singulis corporum naturalium elementa gravia sint, unumquodque tanquam pondus appensum habens considerari potest. Unde inventio centri gravitatis se ad omnia corpora gravia extendit.

153. Problema 17. Fig. 83. Si virgae rigidae AB in singulis punctis P appensa fuerint pondera, quae sint ut respondentes applicatae PM curvae cuiusvis CMD , invenire centrum gravitatis O virgae AB .

Solutio. Cum singulae applicatae curvae CMD exprimant potentias virgae AB applicatas, accipiatur in AB producta, ubi libuerit, punctum Z , ut distantia OZ centri gravitatis O ab hoc Z inveniatur. Est autem (147) OZ aequalis summae factorum ex singulis potentiarum PM in respectivas distantias PZ a Z , divisae per summam omnium potentiarum. Puncto P accipiatur proximum p , erunt singulis elementi Pp punctis potentiae aequales PM vel pm applicatae, ut ergo summa potentiarum elementi Pp applicatarum sit $PM.Pp$, et summa momentorum in elemento $Pp = PM.PZ.Pp$. Ergo summa omnium momentorum in AB erit $\int PM.PZ.Pp$, summa vero omnium potentiarum in AB erit $\int PM.Pp$. Ex quibus erit $OZ = \frac{\int PM.PZ.Pp}{\int PM.Pp}$; seu vocatis $ZP = x$, $PM = y$, erit $Pp = dx$, ergo $OZ = \frac{\int yxdx}{\int ydx}$. Q. E. I.

154. Coroll. 1. Si CD fuerit recta parallela cum AB , erit y constans $= b$, ergo

$$OZ = \frac{\int bxdx}{\int bdx} = \frac{bx}{2x} + C = \frac{x}{2} + C.$$

Si $x = BZ$, erit $OZ = BZ$, ergo $C = \frac{1}{2}BZ$; si $x = AZ$, habebitur $OZ = \frac{AZ + BZ}{2}$, et haec dat punctum O .

155. Coroll. 2. Fig. 84. Si curva, a potentiarum virgae AB applicatis formata, ejusmodi fuerit, ut versus A et B ramos similes et aequales protendat, seu ut verticalis OM , ex medio O virgae AB ducta, curvam in duas aequales partes secet, tum palam est, centrum gravitatis AB in medium O casurum.

156. Coroll. 3. Fig. 85. Generaliter invento punto O , seu centro gravitatis, ut obtineatur potentia omnibus aequivalens, oportet in O applicare potentiam OR , omnibus simul sumtis aequalem. Ita OR erit aequalis $\int ydx$.

157. Coroll. 4. Sit curva AD quadrans circuli, cuius centrum B . Incidat Z in B ; dicta $BP = x$, $PM = y$ et radio $BD = a$, erit $BO = \frac{\int yxdx}{\int ydx}$, et ob $y = \sqrt{aa - xx}$, erit

$$BO = \frac{\int xdx\sqrt{aa - xx}}{\int dx\sqrt{aa - xx}} = \frac{A - \frac{1}{3}(aa - xx)^{\frac{3}{2}}}{\int dx\sqrt{aa - xx}}.$$

Si punctum P incidit in A , erit $x = a$ et $\int dx\sqrt{aa - xx} = \text{quadranti} = Q$. At, quia incidente P in B , BO evanescere debet, erit $A = \frac{1}{3}a^3$; fiat $x = a$, erit $BO = \frac{a^3}{3Q}$ et $OR = Q$; unde momentum hujus potentiae aequivalentis in B erit $OR.Q = \frac{1}{3}a^3$, cui etiam aequatur summa singulorum momentorum in AB .

158. Theorema 16. Fig. 86. Si habeatur virga rigida AB talium in quovis loco ponduscum, ut applicata PM curvae AM exprimat summam omnium ponduscum portionis AP , seu quae exprimat pondus partis AP , erit centrum gravitatis partis AP in O , ut sit

$$PO.PM = \text{areae } APM.$$

Demonstratio. Accipiatur ubivis punctum Q , ducaturque applicata QN , dein proximum ei q et applicata qn ; exprimet QN pondus partis AQ , et qn pondus ipsius Aq , ut igitur nr exhibeat pon-

duseulum elementi Qq . Hujus in P momentum erit $nr.QP$. Puncti P accipiatur sequens p , erit momentum ponderis Qq in $p = nr.Qp$; ergo differentia momentorum in p et P est $= nr.Pp$. Idem cum de omnibus valeat, erit differentia omnium momentorum a portione AP in p et in $P = PM.Pp$. Quanquam in p etiam praeter caetera agat pondusculum elementi Pp , seu ms , tamen id respectu $PM.Pp$ negligitur. Sit jam summa momentorum virgae AP in $P = M$, erit summa momentorum virgae Ap in $p = M + dM$; erit igitur differentia $dM = PM.Pp = PpmM$. Consequenter sumendo integralia erit $M = APM =$ summae momentorum virgae AP in P . Si fuerit O centrum gravitatis virgae AP , erit pondus totius virgae AP , i. e. PM in OP aequale summae omnium momentorum virgae AP in P . Erit igitur

$$PM.OP = APM. \quad Q. E. D.$$

159. Coroll. 1. Ex hoc ergo nascitur nova methodus centrum gravitatis inveniendi; est enim $OP = \frac{APM}{PM}$. Quac methodus interdum altera foecundior esse poterit, praecipue quando totum virgae pondus datur.

160. Coroll. 2. Est igitur $AO = AP - \frac{APM}{PM} = \frac{AP \cdot PM}{PM} - \frac{APM}{PM}$; compleatur rectangulum $APMR$, erit id $= AP \cdot PM$, unde $AO = \frac{APM}{PM}$; hincque semper dabitur distantia centri gravitatis a puncto fixo A .

161. Coroll. 3. Fig. 87. Hinc inveniri potest centri gravitatis fluxus, si longitudo virgae aliquantulum augeatur. Sit O centrum gravitatis virgae AP , et o virgae Ap ; PM est pondus virgae AP , et pm virgae Ap . Erit

$$AO = \frac{AQM}{PM} \text{ et } Ao = \frac{Aqm}{pm} = \frac{AQM + Qq \cdot AP}{PM + Mr}$$

$$\text{ergo } Ao - AO = \frac{PM \cdot AP \cdot Qq - Mr \cdot AQM}{PM^2} = \frac{-Mr \cdot APM}{PM^2}.$$

Est ergo $Oo = \frac{Mr \cdot APM}{PM^2}$. Sit $AP = x$ et ejus pondus $PM = y$, erit $Oo = \frac{dy/dydx}{yy}$.

162. Scholion. Hae proprietates etiam valent, quamquam potentiae applicatae non sint normales in virgam, sed tantummodo parallelae inter se. Nusquam enim in computum ductum est, angulum APM esse rectum, sed saltem constantem.

163. Coroll. 4. Si ergo in O applicetur potentia omnibus aequalis et juxta earundem directionem, aequivalebit ea omnibus simul agentibus (151). Cum autem PM exprimat summam omnium potentiarum virgae AP applicatarum, ducatur OS aequalis et parallela ipsi PM : exprimet haec potentiam omnibus aequivalentem.

164. Coroll. 5. Fig. 88. Si virgae AP in singulis punctis potentiae secundum quascunque directiones fuerint applicatae, resolvantur eae singulae in laterales, quarum una in virgam sit normalis, altera trahat secundum directionem rectae AP . Quaeratur centrum gravitatis pro normalibus, quod sit O , et potentia iis aequivalens OS . Exprimat OD summam reliquarum, quae cum non mutant centrum gravitatis (136), ducatur OE aequivalens duabus OS , OD , aequivalebit ea omnibus.

165. **Coroll. 6.** Momentum omnium potentiarum in P , seu vis, qua virga in P ruptioni resistit, aequatur $OS \cdot OP$, seu $PM \cdot OP$. At est $OP = \frac{APM}{PM}$; ergo summa momentorum omnium potentiarum est area APM . Ergo vis, qua virga in P rumpi conatur, est ut area APM .

166. **Coroll. 7.** Fig. 87. Si ergo vis, qua virga rumpi conatur, sit ut ejus crassities in eo loco, seu ut pondus in eo loco applicatum, erit APM ut rm . Dicatur $AP = x$, $PM = y$, erit $\int ydx$ ut dy , sumto dx pro constante. Ergo fiat $\int ydx = \frac{ady}{dx}$, ut homogeneitas observetur, unde $ydx = \frac{ady}{dx}$, ergo $ydx dy = \frac{ady dy}{dx}$, quare $yydx = \frac{ady^2}{dx} + abdx$, et idcirco $dx = \frac{ady}{\sqrt{(yy-ab)}}$. Sit crassities virgae p , erit pondusculum in elemento Pp ut pdx , ergo $dy = pdx$, consequenter

$$\sqrt{((\int pdx)^2 - ab)} = ap, \text{ unde } \int pdx = \sqrt{(aap + ab)}, \text{ seu } dx = \frac{adp}{\sqrt{(pp+ab)}}, \text{ posito } b = aac.$$

Quae est aequatio pro catenaria, ut infra videbimus; abit haec in logarithmicam, si fiat $c = o$.

167. **Coroll. 8.** Si in singulis punctis potentiae quaecunque sint applicatae, ut pdx in P , erit $\int pdx = y$. Sit porro vis, qua ruptioni resistit z , erit $z = \int dx / pdx$ et $dz = dx / pdx$. Sit dx constans, erit $ddz = pdx^2$; si fuerit p constans $= b$, erit

$$z = \int dx / bdx = \int bxdx + \int cdx = \frac{bxx}{2} + cx + e \text{ seu } xx + cx + ce = bz$$

quae est ad parabolam.

168. **Scholion.** His de virgis rigidis rectis explicatis, progredior ad virgas curvas, et in haurum expositione ea penitus tractabo, quae insuper ad rectas pertinere possent. Etenim multa sunt ad rectas spectantia, quae eadem opera generalius ad curvas extenduntur. Et idcirco, ne in particularibus nimis sim prolixus, ad generaliora accedam.

169. **Problema 18.** Fig. 89. Si virgæ rigidae curvae $ABCD$ quotcunque potentiae AE , BF , CG , DH applicatae fuerint in eodem plano, applicare potentiam MN omnibus aequivalentem.

Solutio. Ducatur recta quaecunque ad , et directiones potentiarum prolongentur, si opus est, quoad ei occurrant in a , b , c , d . Patet (124) eas potentias cundem præstaturas effectum, sive in ad sive in AD sint applicatae. Habemus ergo casum virgæ rectæ, et applicetur potentia aequivalens MN , curvam in M intersecans; transferatur ea in MN , et exprimet MN potentiam omnibus aequivalentem. Q. E. I.

170. **Coroll. 1.** Si directiones potentiarum fuerint parallelae, erit iisdem et MN parallela et omnibus simul sumtis aequalis.

171. **Coroll. 2.** Fig. 90. Transeat recta ad per punctum M , et erit

$$AE \cdot aM \sin a + BF \cdot bM \sin b = CG \cdot cM \sin c + DH \cdot dM \sin d.$$

Est autem, ducta AP in AE normali et perpendiculari in eam MP , $AE \cdot AP = AE \cdot aM \sin a$; eodem modo ductis BQ , CR , DS normalibus in directiones potentiarum, et in eas ex M demissis perpendicularibus, erit $FB \cdot BQ = FB \cdot bM \sin b$, et ita de reliquis. Ut ergo sit

$$AE \cdot AP + BF \cdot BQ = CG \cdot CR + DH \cdot DS,$$

seu summae momentorum ex utraque parte lineae MN sunt aequales.

172. Coroll. 3. Fig. 91. Sint virgæ AOD potentiae parallelae AE, BF, CG, DH applicatae erit OM iis aequivalens, quae est iis parallela et simul sumtis aequalis, et quae est in O applicata, ut ductis in OM perpendicularibus AP, BQ, CR, DS , sit

$$AE \cdot AP + BF \cdot BQ = CG \cdot CR + DH \cdot DS.$$

Oportet igitur ex hac proprietate determinare locum rectæ OM .

173. Coroll. 4. Fig. 92. Simili modo si potentiae quotcunque et qualescumque AE, BF, CG fuerint applicatae, resolvantur eae in verticales Ae, Bf, Cg et horizontales $Ae, B\varphi, C\gamma$: quaeratur aequivalens verticalibus OM , ubi debet esse $Ae \cdot AP + Bf \cdot BQ - Cg \cdot CR = 0$, et aequivalens horizontalibus om , ut sit $Ae \cdot Ap + B\varphi \cdot Bq - C\gamma \cdot Cr = 0$. Quae duæ lineæ om et OM se mutuo in ω intersecant; quia autem per axiomam 5 (§ 124) patet idem esse quocunque in loco potentia applicetur modo in eadem directione applicentur ambae potentiae aequivalentes in ω , quarum aequivalens ω aequivalebit omnibus, quae in debito virgæ puncto applicari poterit.

174. Scholion. Ut facilius quae dicta sunt applicentur, notandum est, summam omnium momentorum potentiarum verticalium in rectam OM esse aequalem nihilo, ut et summam omnium momentorum horizontalium in om ; at attentione habita, quae potentiae et quae lineæ sint affirmativaæ quaque negativaæ. Ut si Fig. 93. summa momentorum potentiarum AE, BF, CG, DH in rectam PS sit = nihilo, hoc modo concipi debet: Si AE et AP sumantur pro affirmativa, erunt BF, BQ, CG et DS negativaæ et RC ac DH affirmativaæ, ut igitur sit

$$AE \cdot AP + BF \cdot BQ - CG \cdot CR - DH \cdot DS = 0.$$

175. Theorema 17. Fig. 94. Si virgæ rigidae AOD potentiae quaecunque AC, BF, CG, DH fuerint applicatae, quarum aequivalens sit OM . Erit, assumto pro lubitu punto Z , ductis rectis AZ, BZ, CZ, DZ et OZ , summa momentorum omnium potentiarum AE, BF, CG, DH aequali momento potentiae OM in Z , seu demonstrari oportet esse

$$AE \cdot AZ \sin EAZ + BF \cdot BZ \sin FBZ + CG \cdot CZ \sin GCZ + DH \cdot DZ \sin HDZ = OM \cdot OZ \sin MOZ.$$

Demonstratio. Ducatur recta quaecunque *ad* secans directiones potentiarum in a, b, c , et o . Patet potentiam OM in o applicatam aequivalere reliquis AE, BF, CG et DH in a, b, c et applicatis. Sed ductis aZ, bZ, cZ, dZ et oZ , est

$$AE \cdot aZ \sin EaZ + BF \cdot bZ \sin FbZ + CG \cdot cZ \sin GcZ + DH \cdot dZ \sin HdZ = OM \cdot oZ \sin MoZ \quad (139).$$

Est vero

$$AE \cdot aZ \sin EaZ = AE \cdot AZ \sin EAZ \text{ et } BF \cdot bZ \sin FbZ = BF \cdot BZ \sin FBZ,$$

et ita de reliquis, ut adeo habeatur

$$AE \cdot AZ \sin EAZ + BF \cdot BZ \sin FBZ + CG \cdot CZ \sin GCZ + DH \cdot DZ \sin HDZ = OM \cdot OZ \sin MOZ. \text{ Q.E.D.}$$

Coroll. 1. Fig. 95. Si directiones potentiarum producantur, et ex Z in eas perpendicula AE, BF, CG, DH , et Zo demittantur, erunt $AE \cdot aZ, BF \cdot bZ, \text{ etc.}$ momenta potentiarum in Z , et ideo $AE \cdot aZ + BF \cdot bZ + CG \cdot cZ + DH \cdot dZ = OM \cdot oZ$.

Coroll. 2. Fig. 96. Si directiones potentiarum fuerint parallelae, lineae Za, Zb, Zc, Zd et Zo coincident, et propterea sequenti modo potentia aequivalens facile determinabitur. Ducatur ex Z recta Za in directiones potentiarum normalis (potest quidem recta quaecunque duci, cum nihilominus anguli ad $a, b, \text{ etc.}$ siant aequales). Erit $AE \cdot aZ + BF \cdot bZ + CG \cdot cZ + DH \cdot dZ = OM \cdot oZ$; sed est $OM = AE + BF + CG + DH$, unde erit $oZ = \frac{AE \cdot aZ + BF \cdot bZ + CG \cdot cZ + DH \cdot dZ}{AE + BF + CG + DH}$,

unde invenitur punctum o , et ex eo O , ubi potentiam aequivalentem applicari oportet.

Coroll. 3. Si potentiae quaecunque fuerint applicatae, resolvantur singulae in verticales et horizontales, quo facto quaeratur potentia verticalibus aequivalens, et etiam potentia horizontalibus aequivalens. Quibus habitis, facile invenietur iis ambabus aequivalens, quae proin omnibus quoque aequivalentib.

Coroll. 4. Fig. 97. Contemplemur rem iterum generaliter, et sint virgæ AOD potentiae quoque, et qualescumque AE, BF, CG, DH applicatae, quibus aequivaleat potentia OM . Sit punctum Z infinite distans, erunt lineae AZ, BZ, CZ, DZ et OZ inter se parallelae, et pro aequalibus haberi poterunt. Quapropter haec proprietas obtinebitur, ut sit $OM \sin MOZ = AE \sin EAZ + BF \sin FBZ + CG \sin GCZ + DH \sin HDZ$.

Coroll. 5. Fig. 98. Si fuerint lineae AZ, BZ etc. parallelae rectae OM , erit $\sin MOZ = 0$, adeoque $0 = AE \sin EAZ + BF \sin FBZ + CG \sin GCZ + DH \sin HDZ$; sed quia anguli GCZ et HDZ in alteram plagam rectarum CZ, DZ cadunt, pro negativis haberi debent eritque $AE \sin EAZ + BF \sin FBZ = CG \sin GCZ + HD \sin HDZ$.

Theorema 18. Fig. 99. Si curvae AM in singulis punctis μ fuerint potentiae quaecunque verticales applicatae, ex curva AN determinatae, ita ut $\pi\nu$ applicata reprezentet summam omnium potentiarum in respondentे arcu $A\mu$ applicatarum. Erit summa momentorum omnium potentiarum arcus AM in M ut area APN .

Demonstratio. Ducatur applicatae $\mu\nu$ proxima $\pi\nu$; exprimet $\lambda\mu$ summam potentiarum arcus Az , ergo $\mu\mu$ exhibet potentiam in $\mu\mu$ applicatam. Ejus momentum in M igitur erit $\varphi\lambda\mu P$. Accipiatur puncto M proximum m , ductaque verticali mpn , erit potentiae $\varphi\mu$ momentum in $m = \varphi\lambda\mu p$; unde differentia horum momentorum erit $\varphi\lambda\mu Pp$. Idem cum de singulis potentiis valeat, erit differentia momentorum potentiarum omnium arcus AM in m et $M = PN.Pp$. Sit summa momentorum omnium in $M = M$, erit summa omnium momentorum in $m = M + dM$, quarum differentia erit dM , ideo $dM = PN.Pp$; ergo summando $M = fPN.Pp =$ areae APN . Q. E. D.

Script. ad marg. Generalius potest applicari ad quascunque potentias; sed tum $\pi\nu$ determinare debet summam factorum omnium potentiarum arcus $A\mu$ in sinus angularum, quos

182. Coroll. 1. Fig. 100. Si curvae AB hoc modo potentiae verticale fuerint applicatae juxta curvam AD , et quaeratur summa momentorum omnium in punctum M ubilibet assumtum, ducatur applicata MP et prolongetur in N , ut sit $PN = CD$, ducaturque recta DN . Exprimet quaevis applicata $\pi\nu$ summam omnium potentiarum arcus $AB\mu$; etenim cum in $B\mu$ nullae potentiae sint applicatae, summa omnium potentiarum BD per totum spatium BM non augetur neque minuitur. Ergo summa momentorum in M est ut area $ACD + CDPN$ (PC, CD).

183. Coroll. 2. Fig. 101. Dicatur $AP = x$, $PM = y$ et summa potentiarum arcus AM sit P ; erit summa omnium momentorum in $M = \int Pdx$. Ergo si arcui AM in quolibet puncto potentiae aequales applicentur, erit P ut arcus AM , qui si dicatur s , erit $P = s$, et summa momentorum omnium in M erit $\int sdx$.

184. Coroll. 3. Si curvae AM potentiae qualescumque fuerint applicatae, resolvantur singulae in laterales, unas verticale secundum MP agentes, et alteras horizontales, juxta MR trahentes. Dicatur summa horizontalium arcus $AM = Q$, erit summa momentorum potentiarum horizontalium $= \int Qdy$, existente summa verticalium $= \int Pdx$.

185. Coroll. 4. Cum momentum sit vis, punctum, in quod agit, circa se ipsum convertendi videamus, num momenta potentiarum verticalium et horizontalium sint conspirantia, an vero minus? Potentiae verticale punctum M conantur convertere secundum plagam AM ; at vero potentiae horizontales MR secundum plagam AR : sunt ergo contrariae ambarum actiones.

186. Coroll. 5. Sin autem potentiae horizontales MR fiant negativae, ut trahant juxta MR , erunt et momentorum vires contrariae, et propterea conspirantes cum verticalibus; omnes enim punctum M conantur convertere secundum eandem plagam AP .

187. Coroll. 6. In illo igitur casu, quo horizontales agunt juxta MR , et summa omnium momentorum, punctum M secundum AP convertentum, $= \int Pdx - \int Qdy$; at in hoc casu potentiarum horizontalium, juxta MR trahentium, erit communis vis convertens punctum M a dextro in sinistrum $= \int Pdx + \int Qdy$.

188. Coroll. 7. Fig. 102. Sint curvae AM in quovis loco μ potentiae normales $\mu\omega$ applicatae; resolvantur eae in verticale $\mu\omega$ et horizontale $\omega\omega$. Sit $A\pi = x$, $\pi\mu = y$ et potentiae $\mu\omega = dz$; erit $\mu\omega = \frac{dxdz}{ds}$, et $\omega\omega = \frac{dxdy}{ds}$, denotante s curva $A\mu$. Erit summa omnium potentiarum verticalium $= \int \frac{dxdz}{ds}dz$, et summa omnium horizontalium $= \int \frac{dxdy}{ds}dy$. Si in integralibus loco x substituatur AP , et loco y , PM , habebuntur summae potentiarum verticalium et horizontalium arcus AM unde momentum omnium in M erit $\int dx \int \frac{dxdz}{ds} + \int dy \int \frac{dxdy}{ds}$; sunt enim conspirantia momenta horizontalium et verticalium.

189. Problema 19. Fig. 103. Curvae AC in singulis punctis potentiiis verticalibus applicatis; determinare punctum O , in quo potentia OR , omnibus aequivalens applicari potest.

Solutio. Cum directiones omnium potentiarum supponuntur parallelae, erit potentia aequivalens omnibus simul sumtis aequalis. Designante autem AD curva supra descripta, erit BD aequalis

omnibus potentias, simul sumtis, sit ergo oportet $OR = BD$. Accipiatur punctum quocunque M ; erit summa momentorum omnium potentiarum in M aequalis momento potentiae aequivalentis OR in M , quod est $OR.QP$, seu $BD.QP$. Ducta autem MP , eaque producta in T , ut sit $PT = BD$, du-
catur recta DT . Exprimetur summa omnium momentorum potentiarum arcus AOC in M , per aream
 $APTDA$ (182), quae est aequalis $ABD + BP.BD$; oportet ergo ut sit

$$ABD + BP.BD = BD.QP = BP.BD + BQ.BD,$$

ergo $ABD = BQ.BD$, consequenter $BQ = \frac{ABD}{BD}$, unde invenietur punctum Q , et ex eo O . Q. E. I.

190. Coroll. 1. Sed distantia AQ erit $AB - \frac{ABD}{BD} = \frac{AB.BD - ABD}{BD}$. Compleatur rectangulum $ABDE$; erit $ABDE = AB.BD$, quare $AQ = \frac{ABDE - ABD}{BD} = \frac{AED}{BD}$; unde denuo punctum Q invenietur.

191. Coroll. 2. Dicatur $AB = x$, $BC = y$ et summa omnium potentiarum arcus $AC = P$; erit area $ABD = \int P dx$, ergo $BQ = \frac{\int P dx}{P}$, et hinc $AQ = x - \frac{\int P dx}{P} = \frac{Px - \int P dx}{P}$. Est vero $Px - \int P dx = \int x dP$, consequenter $AQ = \frac{\int x dP}{P}$;

denotat vero dP potentiam ipsam in quovis loco C applicatam.

192. Coroll. 3. Fig. 104. Existente OR potentia aequivalente omnibus arcus AM ; accedat arcus AM insuper elementum Mm , cum sua potentia applicata, sitque or potentia tum aequivalens, manentibus $AP = x$, $PM = y$, summa omnium potentiarum arcus $AM = P$, erit potentia arculi $Mm = dP$; consequenter $AQ = \frac{\int x dP}{P}$ et $Aq = \frac{\int (x+dx) dP}{P+dP} = \frac{\int x dP + \int dx dP}{P+dP}$. Quapropter $Qq = \frac{P \int dx dP - dP \int x dP}{PP}$; sed quia dP jam pro constanti erat acceptum, tamen oportuisset ponere $Aq = \frac{\int (x+dx) (dP + ddP)}{P+dP}$, erit $\int dx dP = x dP$, consequenter $Qq = \frac{P x dP - dP \int x dP}{PP}$. Est vero $\int x dP = P$, $AQ = z$, erit $Qq = \frac{P x dP - P x dP}{PP} = (x-z) \frac{dP}{P} = PQ \cdot \frac{dP}{P}$. Caeterum haec proprietas etiam invenitur ex inspectione superioris figurae; geometrica re considerata, nec non ex sola differentiatione aequationis $AQ = z + \frac{\int x dP}{P}$, seu $Pz = \int x dP$, quae dat $Pdz = (x-z)dP = PQ.dP$.

193. Coroll. 4. Fig. 105. Si curvae AM in singulis punctis potentiae qualescumque applicentur, resolvantur singulæ in verticales et horizontales, illas juxta MP agentes, has juxta MQ . Sit summa omnium verticalium P , et summa horizontalium Q , manentibus $AP = x$ et $PM = y$; designet OR potentiam aequivalentem verticalibus, et VS aequivalentem horizontalibus, erit $AT = \frac{\int x dP}{P}$ et $AX = \frac{\int y dQ}{Q}$, unde O et V invenientur, cum vero sit $OR = P$ et $VS = Q$, poterit inveniri po-
tentia aequivalens duabus OR et VS , quae proin aequivalebit omnibus.

194. Coroll. 5. Fig. 106. Sit curva AM catenaria, seu curva, quam format catena suspensa; erit ut infra videbimus $dx = \frac{ady}{\sqrt{(2ay+yy)}}$. Sint huic curvae in singulis punctis potentiae aequales

applicatae verticale; erit P ut arcus AM ; dicatur $AM = s$, erit P ut s ; est itaque $AT = \int_{\frac{1}{2}}^{xds}$
 Est autem $ds = \frac{(a+y)dy}{\sqrt{2ay+yy}}$ et $s = \sqrt{2ay+yy}$. Quia porro est
 $\int xds = sx - \int sdx$, erit $\int xds = x\sqrt{2ay+yy} - \int ady = x\sqrt{2ay+yy} - ay$,
 quare $AT = x - \frac{ay}{\sqrt{2ay+yy}}$.

Sed cum sit $dx = \frac{ady}{\sqrt{2ay+yy}}$, erit $x = \frac{ay}{\sqrt{2ay+yy}} + \int \frac{aydy(a+y)}{(2ay+yy)^{\frac{3}{2}}}$, unde $AT = - \int \frac{aydy(a+y)}{(2ay+yy)^{\frac{3}{2}}}$,
 quod a logarithmis dependet. Erit autem

$$PT = \frac{ay}{\sqrt{2ay+yy}} = \frac{a \cdot PM}{AOM}; \text{ ergo } OR \cdot PT \text{ erit, ob } OR = s = \sqrt{2ay+yy}$$

aequale ay ; consequenter summa momentorum in M est ut PM . Alia exempla non in medium affer
 facile enim ex praescriptis applicatio ad quosvis casus speciales absolvetur.

195. Problema 20. Fig. 107. Si curvae AMB in singulis punctis potentiae quaecunque a
 punctum idem C tendentes fuerint applicatae, invenire potentiam iis aequivalentem.

Solutio. Cum omnes potentiae tendant ad punctum C , singulae tanquam puncto C applicatae
 considerari possunt. Assumatur elementum Mm , sitque potentia in ejus singulis punctis applicata
 $= z$, erit potentia in elementum Mm agens $= z \cdot Mm = zds$ dicto $Mm = ds$. Applicetur igitur po
 tentia CN in directum cum MC , fiatque $CN = zds$. Oportet ergo omnium potentiarum CN invenire
 aequivalentem (55.56) CV , seu punctum H , ita ut CH , ducta in numerum potentiarum, exprima
 potentiam aequivalentem. Est vero numerus potentiarum aequalis numero punctorum curvae AMB
 adeoque aequalis ipsi curvae AMB . Ducatur recta quaecunque DP , et ex N demittantur in eam per
 pendicula NP , quorum summa dividatur per AB , quoque aequalis accipiatur DK . Dein quoque
 accipiatur DJ , aequalis omnium DP summae, divisae per AB , completoque rectangulo $DKHJ$, en
 H id punctum, et recta CH ducta in AB seu CV exhibebit potentiam aequivalentem. Producatur
 HC in O , et erit O punctum, in quo potentia aequivalens modo inventa secundum directionem OC
 applicari debet. Q. E. I.

196. Coroll. 1. Fig. 108. Quaeratur arcus AOM punctum O , in quo media directio terminatur, seu in quo potentiam aequivalentem applicare oportet. Ducatur recta AC , eaque producatur ut loco verticalis DP haberi queat; ei in C normaliter jungatur CQ , pro axe curvae habenda. Si $CQ = x$, $MQ = y$, erit $CM = \sqrt{xx+yy} = t$; sit $AOM = s$, et potentia in M applicata $CN = zds$
 erit $CP = \frac{yzds}{t}$ et $PN = \frac{xzds}{t}$; accipi ergo debet $CJ = \int \frac{yzds}{t} : s$ et $CK = \int \frac{xzds}{t} : s$. Completo rectan
 gulo $CJHK$, ducatur diagonalis CH , quae producta curvam in O secat; erit O punctum applicationis
 OC directio et $CH \cdot s$ quantitas potentiae aequivalentis.

197. Coroll. 2. Potest quoque CJ accipi aequalis $\int \frac{yzds}{t}$ et $CK = \int \frac{xzds}{t}$, eas non dividendo
 per s . Sed tum ipsa CH erit potentia aequivalens, ut non opus sit eam in s ducere. Hoc ergo
 modo facilius et brevius punctum O obtinebitur.

198. Coroll. 3. Fig. 109. Si punctum M ponatur variabile, et O continuo mutabitur ut et punctum H . Invenientur igitur hoc modo omnia loca puncti H , seu curva EH , quam id percurrit. Habetur autem aequatio pro curva EH inter coordinatas, scilicet abscissa CJ erit $= \int \frac{yds}{t}$ et applicata $Dg = \int \frac{xxds}{t}$. Data igitur curva AM et legi potentiarum, ei in singulis locis applicatarum, invenietur aequatio pro curva EH .

199. Coroll. 4. Ex solutione problematis et ejus collatione cum § 58 patet, eodem modo rem se habere, ac si punctum C ad singula curvae AM puncta traheretur eadem vi, qua ea ad C sunt ponuntur. Et propterea exempla in medium afferre non necesse esse duxi, cum ibi jam nonnulla sint annexa.

200. Scholion. Hisce de aequilibrio potentiarum virgae rigidae liberae applicatarum sufficientibus judicatis, ad alterum virgarum rigidarum casum propero, quo eae quodammodo impeditae potinuntur, ut non libere cuivis potentiae cedere queant, et interdum in quiete perseverare possint, etsi potentia quaedam alia non destruatur.

201. Divisio. Hanc sectionem hoc modo partior, ut primo de virga, in quodam puncto prorsus firmata, agam; dein, de virga alicubi ita saltet firmata, ut tantum circa illud punctum motu circulari moveri queat. Tertio, de virga, cuius aliquod punctum perpetuo in data linea positum esse debet. Quarto, de virga, lineae cuivis firmae adjacente, ut eam semper tangat, nunquam transigere queat. Quinto, de virga, cuius duo puncta continuo in datis curvis ponuntur, et sexto, de virga, quae punctum quoddam in data curva mobile habet; et quae praeterea super alia data linea jacet, juxta quartum casum. Hoc modo penitus istam materiam exhausisse autumo, ut vix casus excogitari possit, qui in enumeratis non contineatur. Hoc igitur pertractato, tam in hypothesi virgae rectae, quam curvae cuiusvis.

202. Theorema 19. Fig. 110. Si virgae AB in A prorsus firmae applicetur in B potentia quaecunque BC , poterit ea duplē habere effectum, unum, quo virgam BA evellere, alterum, quo eam abrumpere conatur.

Démonstratio. Sit virgae AB applicata potentia in directum jacens BE , conabitur haec virgam AB directe evellere. Sed si potentia applicata BF fuerit in AB perpendicularis, ejus tota actio in abrumpenda virga consumetur. Quare cum potentia quaecunque, quae neque in directum BE , neque perpendiculariter secundum BF trahit, in hujusmodi duas resolyi possit, ut potentia BC in BE , et BF , duplē modo in virgam aget, uno, quo eam evellere, propter BE , et altero, quo eam abrumpere, propter BF , conatur. Q. E. I.

203. Coroll. 1. Quod ad quantitatem horum conatum attinet, patet conatum evellendi virgam esse ut potentiam BE , neque hic locum applicationis B in computum venire.

204. Coroll. 2. Ne ergo virga cedat, oportet ut retineatur, seu retrorsum trahatur vi aequali vel majori, quam est vis BE .

205. Coroll. 3. Quantitas conatus abrumpendi virgam AB est aequivalens momento potentiae BF , seu facto ex BF in AB .

206. Coroll. 4. Fig. 111. Ne igitur haec potentia effectum suum obtineat, oportet applicare contrarie agentem GH , cuius momentum $HG \cdot AG$ aequaliter sit momento $BF \cdot AB$; unde patet, si ea potentia in puncto A applicari debeat, eam oportere esse infinitam, ut eius tempore motio infinita.

207. Coroll. 5. Fig. 112. Si virga fuerit curva AB in A firmata et in B applicata habet potentiam BC , ducatur tangens Ab ex A et producatur CB ut eam in b secet, potentia BC tanquam in b applicata considerari potest, quae, ut praeceps est, resoluta, dabit effectus in punctum A nemppe unum, quo evellitur, alterum quo abrumptur.

208. Coroll. 6. Si tali virgae, vel rectae vel curvae, plures una potentiae sint applicatae, quid eae in virgam possint, opus non est particulariter inquirere. Nam cum in praecedentibus methodus tradita sit, qua una potentia iis aequivalens inveniri potest: quaeratur ea, eritque casus plurium potentiarum ad casum unicea reductus; qui hic est expositus.

209. Problema 21. Fig. 113. Si virgae ABC , in duobus punctis A et B firmatae potentia CD in punto C applicetur, invenire vires, quas puncta A et B sustinent.

Solutio. Ponatur primo punctum A solum firmum, et quaeratur potentia in B applicanda quae actionem potentiae CD destruat. Sit ea Be , et oportet, ut momenta potentiarum CD , Be in A sint aequalia et contraria. Producatur eB in alteram partem; ex punctis A et C in eam demittantur perpendicularia CG , AH . Erit momentum potentiae CD in A $= CD(CG + AH)$, et momentum potentiae $Be = Be \cdot AH$; ergo $CD(CG + AH) = Be \cdot AH$, unde $Be = CD(CG + AH) \cdot AH$. Hanc ergo vim punctum B sustinet; adeoque ea sursum trahi debet. Simili modo punctum A sursum sollicitatur a potentia CD vi $= CD \cdot CG : AH$ (posito B puncto fixo). Ergo tanta vi deorsum urgeri debet. Q. E. I.

210. Coroll. 1. Solutio problematis ex eo pendet, quomodo virgae ABC potentiae in punctis A et B applicari debeant, data potentia in C applicata; ut obtineatur aequilibrium. Cum hoc sit in priori parte hujus capituli pertractatum, quales potentiae virgae applicatae esse debeant, ut ad aequilibrium plures casus, ubi vires quaeruntur, quibus plura puncta virgae urgentur, praetermittere.

211. Coroll. 2. Fig. 114. Si virga fuerit recta AC , siquemin C potentia CD normaliter applicata, erit vis, quam B sustinet $= CD \cdot CA : AB$; et si vis, quam A sustinet $= CD \cdot CB : AB$. Cum autem sit $CD \cdot CA : AB = CD \cdot CB : AB + CD$, manifestum est vim, quam punctum B sustinet, aequaliter esse summae potentiarum puncta C et A urgentium.

212. Coroll. 3. Fig. 115. Hinc igitur perspicuum est, quantam vim clavi A et B sustinet debeant a trabe AC , potentia CD sollicitato, utrumque enim de loco movere conatur.